

平成 29 年 12 月 26 日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 平成 29 年 12 月 25 日付 (2 件)

(1)モンカット粒剤

登録第 16796 号

使用時期の追加: 葉しょうが(紋枯病)/生育期 但し、収穫 3 日前まで

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラルを含む農薬の総使用回数
葉しょうが	紋枯病	4kg/10a	植付時	1 回	土壌表面散布	4 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、 植付後は 3 回以内)
			生育期 但し、 収穫 3 日前まで	3 回以内		

* 注意事項の変更はありません。

(2)モンカットフロアブル40

登録第 19252 号

作物名の追加: 畑わさび/茎腐病、2000 倍、収穫 30 日前まで、2 回以内、土壌灌注

にら(花茎)/白絹病、2000 倍、収穫前日まで、2 回以内、株元散布

ししとう/白絹病、1000 倍、収穫前日まで、3 回以内、株元灌注

【追加】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラルを含む農薬の総使用回数
畑わさび	茎腐病	2000 倍	3ℓ/m ²	収穫 30 日前まで	2 回以内	土壌灌注	3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)
にら (花茎)	白絹病		100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2 回以内	株元散布	3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)
ししとう	白絹病	1000 倍	1ℓ/株	収穫前日まで	3 回以内	株元灌注	4 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 3 回以内)

* 注意事項の変更はありません。

以上