

平成 30 年 4 月 2 日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

1.新規登録 平成 30 年 3 月 30 日付 (2 件)

(1)パレード 20フロアブル

登録第 24071 号

有効成分:ピラジフルミド…20.0% 毒性:毒物劇物に該当せず 危険物区分:一

【適用病害虫の範囲及び使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
あずき いんげんまめ 豆類(未成熟)	菌核病、灰色かび病	2000～ 4000 倍	100～ 300 ℓ /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
トマト ミニトマト	灰色かび病、葉かび病 うどんこ病						
なす	灰色かび病、すすかび病	2000 倍					
	菌核病、うどんこ病	2000～ 4000 倍					
きゅうり	灰色かび病、菌核病 うどんこ病、褐斑病						
にがうり	うどんこ病	2000 倍					
すいか	菌核病、うどんこ病	2000～ 4000 倍					
メロン	つる枯病、うどんこ病						
はくさい	黒斑病、白斑病						
キャベツ	菌核病、株腐病						
ブロッコリー	菌核病						
レタス 非結球レタス	菌核病、灰色かび病 すそ枯病						
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病						
ねぎ	黒斑病、葉枯病						
	さび病			2000 倍			
いちご	うどんこ病、灰色かび病		2000～ 4000 倍				
ピーマン	うどんこ病						
きく	白さび病	4000 倍					
	うどんこ病						
ばら	うどんこ病、黒星病						
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)	うどんこ病						

【使用上の注意事項】

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)使用前によく振ってから使用すること。
- (3)散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- (4)薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
- (5)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

(2)パレード 15フロアブル

登録第 24072 号

有効成分:ピラジフルミド…15.0% 毒性:毒物劇物に該当せず 危険物区分:一

【適用病害虫の範囲及び使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数	
りんご	黒星病、斑点落葉病、輪紋病 すす点病、すす斑病、うどんこ病 褐斑病	2000～ 3000 倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
	黒点病、赤星病	2000 倍						
おうとう	灰星病	2000～ 3000 倍						
なし	黒星病、輪紋病、うどんこ病 赤星病							
	黒斑病	2000 倍						
もも ネクタリン	灰星病、黒星病	2000～ 3000 倍						
小粒核果類 (すももを除く)	黒星病							
すもも	灰星病、黒星病							
ぶどう	黒とう病、さび病	2000 倍						収穫 7 日前 まで
	灰色かび病、褐斑病							
かき	うどんこ病	2000～ 3000 倍	収穫前日 まで					
かんきつ	灰色かび病、そうか病		収穫 7 日前 まで					

【使用上の注意事項】

- (1)使用前によく振ってから使用すること。
- (2)散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- (3)薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
- (4)ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけること。
- (5)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

2.適用拡大 平成 30 年 3 月 30 日付 (2 件)

(1)アクセルフロアブル

登録第 22461 号

作物名の追加:うめ/ケムシ類(1000 倍)、ケキスイ類(1000~2000 倍)、収穫前日まで、3 回以内
 とうもろこし/アワノメイガ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 アスパラガス/ハスモンヨトウ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 ごぼう/ハスモンヨトウ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 トマト、ミニトマト/オオタバコガ、ハスモンヨトウ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 ピーマン/オオタバコガ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 なす/オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 にんじん/ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類、1000 倍、収穫前日まで、3 回以内
 ねぎ/シロイチモンヨトウ、1000 倍、収穫前日まで、2 回以内
 ほうれんそう/ハスモンヨトウ、シロビノメイガ、1000~2000 倍、収穫前日まで、3 回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフルミゾンを含む農薬の総使用回数
うめ	ケムシ類	1000 倍	200~700L/10 a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ケキスイ類						
アワノメイガ							
とうもろこし	アワノメイガ	100~300L/10 a					
アスパラガス	ハスモンヨトウ	100~800L/10 a					
ごぼう							
トマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000~2000 倍	100~300L/10 a				
ミニトマト							
ピーマン	オオタバコガ						
なす	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ ハスモンヨトウ						
にんじん	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類			1000 倍	2 回以内		
ねぎ	シロイチモンヨトウ						
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロビノメイガ			1000~2000 倍	3 回以内	3 回以内	

* 注意事項の変更はありません。

(2)アクセルベイト

登録第 22875 号

作物名の追加:アスパラガス、いちご/ハスモンヨトウ、収穫前日まで、3~6kg/10a、3 回以内
 ねぎ/ネキリムシ類、収穫前日まで、3~6kg/10a、2 回以内
 にんじん/ネキリムシ類、ハスモンヨトウ(3~6kg/10a)、コオロギ類(6kg/10a)、収穫前日まで、3 回以内
 ごぼう/ネキリムシ類(3~6kg/10a)、収穫前日まで、3 回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフルミゾンを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネキリムシ類	3~6 kg/10 a	収穫前日まで	2 回以内	株元 散布	2 回以内
アスパラガス	ハスモンヨトウ			3 回以内		3 回以内
にんじん	ネキリムシ類、ハスモンヨトウ					
	コオロギ類					
ごぼう	ネキリムシ類	3~6 kg/10 a	3 回以内	3 回以内		

* 注意事項の変更はありません。

以上