

平成 30 年 6 月 15 日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 平成 30 年 6 月 13 日付 (4 件)

(1)ダニコングフロアブル

登録第 23946 号

作物名の追加:いちご/ハダニ類、3000 倍、収穫前日まで、1 回

花き類・観葉植物/ハダニ類、2000 倍、発生初期、1 回

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルピトを含む農薬の総使用回数
いちご	ハダニ類	3000 倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	1 回	散布	1 回
花き類・観葉植物		2000 倍		発生初期			

* 注意事項の変更はありません。

(2)日農エルサン乳剤

登録第 7263 号

適用病害虫名の追加:かんしょ/ハスモンヨトウ(1000 倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	PAP を含む農薬の総使用回数
かんしょ	ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ	1000 倍	100~300ℓ /10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内

* 注意事項の変更はありません。

(3)オキシラン水和剤

登録第 21247 号

適用病害虫名の追加:ベリー類(ブルーベリーを除く)/茎枯病(ふさすぐり) (600 倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
ベリー類 (ブルーベリーを除く)	斑点病 茎枯病(ふさすぐり)	600 倍	200~700ℓ /10a	収穫終了後~ 落葉期まで	3 回以内	散布	3 回以内	3 回以内

* 注意事項の変更はありません。

(4)フジワンラップ粒剤

登録第 22564 号

適用病害虫名の追加: 稲/稲こうじ病(4kg/10a)

【変更後】

作物名	使用目的	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	イプロオランを含む農薬の総使用回数
稲	—	いもち病	3~4kg /10a	葉いもちに対しては 初発 7~10 日前 穂いもちに対しては 出穂 10~30 日前 但し、収穫 30 日前まで	2 回以内	湛水 散布	2 回以内 (は種時(直播)又は 移植時までの処理 は 1 回以内)	3 回以内 (移植前は 1 回以 内、本田では 2 回 以内)
		ウンカ類 ニカメイチュウ		収穫 30 日前まで				
		カムシ類	4kg /10a	出穂 10~30 日前 但し、収穫 30 日前まで				
	稲こうじ病	出穂 10~20 日前 但し、収穫 30 日前まで						
登熟歩合向上	—							

* 注意事項の変更はありません

以上