

平成 30 年 7 月 12 日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 平成 30 年 7 月 11 日付 (4 件)

(1)アプロードフロアブル

登録第 19923 号

作物名の追加:あさつき(伏せ込み栽培)/ネダニ類、500 倍、3ℓ/㎡、植付時、1 回、株元灌注

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フプロフェンを含む農薬の総使用回数 |
|------------------|--------|-------|------|------|---------|------|-------------------|
| あさつき (伏せ込み栽培) | ネダニ類 | 500 倍 | 3ℓ/㎡ | 植付時 | 1 回 | 株元灌注 | 1 回 |

* 注意事項の変更はありません。

(2)アクセルベイト

登録第 22875 号

作物名の追加:しょうが/ネキリムシ類、3~6kg/10a、収穫前日まで、3 回以内

【追加】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メフルジンを含む農薬の総使用回数 |
|------|--------|---------------|------------|---------|------|------------------|
| しょうが | ネキリムシ類 | 3~6kg /10a | 収穫前日 まで | 3 回以内 | 株元散布 | 3 回以内 |

* 注意事項の変更はありません。

(3)フジドーLフロアブル

登録第 23002 号

〈1〉適用内容の変更

①作物名の追加:だいこん/黒斑細菌病、500 倍

②適用病害虫名の追加:たまねぎ/りん片腐敗病(500 倍)

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------|-------|------------------|------|---------|------|--------------|
| たまねぎ | 軟腐病 りん片腐敗病 | 500 倍 | 100~300ℓ /10a | — | — | 散布 | — |
| だいこん | 黒斑細菌病 | | | | | | |

〈2〉注意事項の変更

【追加する注意事項】

・だいこんに使用する場合、次の事項に注意すること。

1)幼苗期の散布又は過度の連用は、薬害を生じるおそれがあるのでさけること。

2)薬害を生じるおそれがあるので、薬害軽減のために必ず炭酸カルシウム水和剤を加用すること。ただし、収穫間際には汚れを生じるので留意すること。

3)病害発生後の散布では効果が劣るので、発生前から予防的に散布すること。

(4)ピカピカ粒剤

登録第 20234 号

「稲(箱育苗)」のピロキロンを含む農薬の総使用回数変更:3 回以内(育苗箱散布は 1 回以内、本田では 2 回以内)

⇒3 回以内(移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)

* 注意事項の変更はありません。

以上