

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

・適用拡大 2021年8月25日付(4件)

(1) ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤

登録第24135号

作物名及び使用方法の追加: 稲/(いもち病、ウカ類、コブノメガ)、移植時、側条施用

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメギピリムを含む農薬の総使用回数	チアゾニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 コブノメガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	1回	3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)

【変更する注意事項】

・側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用すること。

(2) ブイゲットハコレンジャーL粒剤

登録第24233号

作物名及び使用方法の追加: 稲/(ウカ類、コブノメガ)、移植時、側条施用

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	ウカ類、コブノメガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用

クロントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメギピリムを含む農薬の総使用回数	チアゾニルを含む農薬の総使用回数	チフルザミドを含む農薬の総使用回数
1回	1回	3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

【変更する注意事項】

・側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用すること。

(3) ハコガード粒剤

作物名及び使用方法の追加: 稲/(ウカ類、コブメカ)、移植時、側条施用

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	ウカ類、コブメカ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用

クロナトリピロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメピリムを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数	チルザミドを含む農薬の総使用回数
1回	1回	3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

【変更する注意事項】

・側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用すること。

(4) 日農ロックス

登録第 22896 号

①使用時期の変更: かんしょ/苗移植 5 日前頃まで ⇒ 苗移植前まで

②本剤の使用回数の変更: らっきょう(生育期 但し、収穫 30 日前まで)/1 回 ⇒ 2 回以内

③リニuronを含む農薬の総使用回数の変更: らっきょう/2 回以内

(種球植付後は 1 回以内、生育期は 1 回以内) ⇒ 3 回以内(種球植付後は 1 回以内、生育期は 2 回以内)

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	リニuronを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
かんしょ	一年生雑草	種いも植付後 萌芽前まで	200g/10a	70~150 ℓ/10a	1 回	全面土壌 散布	2 回以内 (全面土壌 散布は 1 回以内、 雑草茎葉兼 土壌散布は 1 回以内)
		苗移植前まで	150~200 g/10a				
	一年生 広葉 雑草	生育期 但し、収穫 45 日前まで (雑草生育期)	100~200 g/10a			雑草茎葉兼 土壌散布 (畦間処理)	
らっきょう	一年生 雑草	種球植付後 (雑草発生前)	150g/10a	1 回	畦間土壌 散布	3 回以内 (種球植付後は 1 回以内、 生育期は 2 回以内)	
		生育期 但し、収穫 30 日前まで			2 回 以内		全面土壌 散布

* 注意事項の変更はありません。

以上