

2019年5月16日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2019年5月15日付(6件)

(1)アプロード水和剤

登録第 15677 号

適用病害虫名の追加:キウイフルーツ/キウイヒメヨコバイ(1000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフェジンを含む農薬の総使用回数
キウイフルーツ	カイガラムシ類幼虫 キウイヒメヨコバイ	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

* 注意事項の変更はありません。

(2)ダブルフェースフロアブル

登録第 23629 号

適用病害虫名の追加:茶/チャトゲコナジラミ(2000倍)

かんきつ/チャノホコリダニ(2000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルピドを含む農薬の総使用回数	フェニロキシメトを含む農薬の総使用回数
茶	チャノホコリダニ カンザワハダニ チャノガサビダニ	2000~3000倍	200~400ℓ /10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回	2回以内
	チャトゲコナジラミ	2000倍						
かんきつ	チャノホコリダニ	2000~3000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日まで				
	ミカンハダニ ミカンサビダニ							

* 注意事項の変更はありません。

(3)日農オマイト水和剤

登録第 8202 号

適用病害虫名の追加:みかん/ミカンサビダニ(750倍)、かんきつ(みかんを除く)/ミカンサビダニ(750倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPPSを含む農薬の総使用回数
みかん	ハダニ類 ミカンサビダニ	750倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
かんきつ (みかんを除く)				収穫14日前まで			

* 注意事項の変更はありません。

(4)日農デナポン 5%ベイト

登録第 12885 号

- ①本剤の使用回数変更:たばこ/「—」⇒「1回」
- ②NACを含む農薬の総使用回数変更:たばこ/「—」⇒「2回以内」
- ③使用方法の変更:たばこ/「株元処理」⇒「株元散布」

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	NACを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ハスモンヨウ、ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
	コオロギ、ダンゴムシ	3~4kg/10a				
はくさい	ハスモンヨウ、ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫21日前まで			
	コオロギ、ダンゴムシ	3~4kg/10a				
たばこ	ネキリムシ類	3~6kg/10a	移植時	1回	株元散布	2回以内
だいこん			収穫30日前まで	4回以内	株元散布	4回以内

* 注意事項の変更はありません。

(5)日農モスピラン顆粒水溶剤

登録第 22584 号

- ①適用病害虫名の追加:もも、小粒核果類(うめ、すももを除く)、うめ、すもも、さくら /クビアカツヤカミキリ(2000倍)
- ②作物名の変更:樹木類(まつ、やなぎを除く)⇒樹木類(まつ、やなぎ、さくらを除く)、さくら

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセチプロトを含む農薬の総使用回数				
もも	アブラムシ類、モモハモグリカ [*] シクイムシ類、アザミウマ類 カメムシ類、コガネムシ類成虫	2000~4000倍	200~700g/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内				
	コスカシバ、カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	2000倍									
	モモチヨッキリゾウムシ	4000倍									
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2000~4000倍									
	カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2000倍									
うめ	アブラムシ類	2000~6000倍									
	ケシクスイ類、ノコギリキリカ [*] クビアカツヤカミキリ、カイガラムシ類	2000倍									
すもも	アブラムシ類、シクイムシ類	2000~4000倍									
樹木類 (まつ、やなぎ、さくらを除く)	ゲンバユスデ蛾類	2000倍						発生初期	5回以内		5回以内 (樹幹注入は1回以内)
さくら	クビアカツヤカミキリ										

* 注意事項の変更はありません。

(6)ツルギフロアブル

登録第 23980 号

〈1〉適用雑草名の変更

移植水稻/一年生雑草及び多年生広葉雑草

直播水稻/一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	移植直後～ /ビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで	500ml/10a	1回	原液湛水散布、 水口施用又は 無人航空機による滴下
		移植時			田植同時散布機で施用
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ	稲 1 葉期～ /ビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで			原液湛水散布又は 無人航空機による滴下

イフェカルバゾンを含む 農薬の総使用回数	イマズスルフロンを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

〈2〉注意事項の変更

【変更後】(変更箇所のみ)

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワは 2 葉期まで、ヘラオモダカは 3 葉期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈 3 cmまでが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

以上