

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2020年7月22日付(4件)

(1) パレード20フロアブル

登録第24071号

①使用方法の追加:ねぎ/黒腐菌核病、100倍、セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ、灌注

②ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数の変更:ねぎ/3回以内⇒3回以内(灌注は1回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内)
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病	2000倍					

* 注意事項の変更はありません。

(2) メジャーフロアブル

登録第23804号

①作物名の追加:トルギキョウ(斑点病)、2000倍、発病初期、3回以内

②適用病害虫名の追加:たまねぎ/黒かび病(2000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピロキシストロビンを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
トルギキョウ	斑点病	2000倍		発病初期			

* 注意事項の変更はありません。

(3) 日農エルサン乳剤

登録第 7263 号

適用病害虫名の追加: あずき/マホクチゾウムシ(1000 倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	PAP を含む農薬の総使用回数
あずき	アブラムシ類	1000~2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アスキメイト マホクチゾウムシ	1000 倍					

* 注意事項の変更はありません。

(4) エコパートフロアブル

登録第 20184 号

①使用方法の変更: 雑草茎葉散布⇒雑草茎葉散布又は全面散布

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
小麦 (春播)	一年生 広葉雑草	小麦2~4葉期 (広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで	50~100 mℓ/10a	100ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布	北海道	2回以内
小麦 (秋播)		小麦止葉抽出前まで (春期広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで	50~75 mℓ/10a					
		小麦節間伸長開始期まで (広葉雑草2~4葉期、 ヤムグラ2~6節期) 但し、収穫45日前まで	50~100 mℓ/10a				全域 (北海道を 除く)	
大麦		大麦節間伸長開始期まで (広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで						
こんにゃく		植付後~萌芽前 (広葉雑草2~4葉期)						

②注意事項の追加

【追加】

- ・雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布すること。

以上