

お客様各位

日本農薬株式会社

## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

・適用拡大 2021年2月10日付(4件)

(1) コルト顆粒水和剤

登録第 22797 号

適用病害虫名の追加: ねぎ、たまねぎ/ネギハモグリバエ(2000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネギアザミウマ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	ネギハモグリバエ			収穫前日まで			

\* 注意事項の変更はありません。

(2) 日農ハチハチ乳剤

登録第 24193 号

①適用病害虫名の追加: だいこん/白さび病(2000倍)

ねぎ/ネギハモグリバエ(1000倍)

②作物名の追加: しきみ/アザミウマ類(1000倍)、発生初期、4回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェニトドを含む農薬の総使用回数
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジハマムシ ハイダラメイガ、ナモグリバエ カブラハバチ、ダイコンサルハムシ 白さび病	2000倍	100~300 ℓ/10a	収穫30日前 まで	1回	散布	1回
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ、シロイモジヨウ さび病、べと病	1000倍		収穫7日前 まで	2回以内		2回以内
しきみ	アザミウマ類	1000倍	100~700 ℓ/10a	発生初期	4回以内		4回以内

【追加する注意事項】

・街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

(3) 日農スプレーオイル

登録第 10601 号

・作物名の追加:キウイフルーツ/カイラムシ類(100倍)、発芽前

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシン油を含む農薬の総使用回数
キウイフルーツ	カイラムシ類	100 倍	200~700ℓ/10a	発芽前	—	散布	—

\* 注意事項の変更はありません。

(4) 日農フォース粒剤

登録第 18313 号

①使用方法の追加:ねぎ/株元散布(クロバネキノコバエ類、ネダニ類)

②テフルリンを含む農薬の総使用回数変更:

ねぎ/1 回⇒2 回以内(定植時までの処理は 1 回以内、定植後の処理は 1 回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルリンを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネキリムシ類	4~9kg/10a	定植時	1 回	作条土壌混和	2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の処理は 1 回以内)
	ネダニ類 クロバネキノコバエ類	9kg/10a				
	クロバネキノコバエ類	9kg/10a	土寄せ前 但し、収穫 30 日前まで	1 回	株元散布	
	ネダニ類	6~9kg/10a				

【注意事項の追加】

・ねぎのネダニ類に対して土寄せ前に使用する場合は、根部周辺に薬剤が届きやすい生育期前半の期間に使用すること。

以上