

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

・適用拡大 2021年3月10日付(5件)

(1) フェニックス顆粒水和剤

登録第 21916 号

適用病害虫名の追加:とうもろこし、ヤングコーン/ツマジロクサヨウ(2000~4000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
とうもろこし ヤングコーン	アワメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨウ	2000~4000倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

* 注意事項の変更はありません。

(2) アクセルフロアブル

登録第 22461 号

適用病害虫名の追加:とうもろこし/ツマジロクサヨウ(1000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタルジンを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アワメイガ	1000~2000倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ツマジロクサヨウ	1000倍					

* 注意事項の変更はありません。

(3) 日農スミチオン乳剤

登録第 5042 号

適用病害虫名の追加:とうもろこし/ツマジロクサヨウ(1000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アワメイガ カメシ類 ツマジロクサヨウ	1000倍	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内

* 注意事項の変更はありません。

(4) 日農パーマチオン水和剤

登録第 15462 号

適用病害虫名の追加:とうもろこし/ツマジロクサヨウ(1000~2000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンハレートを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アワメイガ ツマジロクサヨウ	1000~ 2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内	4 回以内

* 注意事項の変更はありません。

(5) Zボルドー

登録第 24041 号

使用方法の追加:ブロッコリー/黒腐病(16倍、3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の 総使用回数
ブロッコリー	花蕾腐敗病	500 倍	100~300ℓ/10a	—	—	散布	—
	黒腐病	16 倍	3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	

【注意事項の変更】

・無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ること。

- ① 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ② 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ③ 少量散布の場合には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。
- ④ 沈殿が生じるおそれがあるため、散布薬液調製後は速やかに散布すること。
- ⑤ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- ⑥ 散布薬液の飛散によって自動車やカート等の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- ⑦ 散布終了後は次の項目を守ること。
 - (a) 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理すること。
 - (b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タケの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。

以上