

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

・適用拡大 2021年8月11日付(2件)

(1) ネマクリーン粒剤

登録第 23962 号

適用病害虫名の追加:ばれいしよ/ネグサレセンチュウ(20 kg/10a)

ごぼう/ネコブセンチュウ(20 kg/10a)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
ばれいしよ	ジャガイモシロストセンチュウ ジャガイモシロストセンチュウ ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回
ごぼう	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ		は種前		播溝土壌混和	

* 注意事項の変更はありません。

(2) 日農モスピラン顆粒水溶剤

登録第 22584 号

①作物名の追加:レイシ(カイガラムシ類)、2000倍、収穫7日前まで、3回以内

いんげんまめ(アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、カメムシ類)、2000~4000倍、収穫14日前まで、3回以内

②作物名の変更:食用カーネーション、食用エキザカム、食用せんにちこう、食用トニア、食用パンジー、食用なでしこ

⇒食用花(食用ぎく、食用ニバラ、食用金魚草、食用プリムラを除く)

豆類(種実、ただし、だいずを除く)⇒豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く)

③適用病害虫名の追加:いちご/チバクロバネキノコバエ(2000~4000倍)

えだまめ、さやいんげん/カメムシ類(4000倍)、かんしょ/ヨツモンカメコハムシ(4000倍)

なす/コナカイガラムシ類(2000倍~4000倍)、にんにく/アブラムシ類(2000~4000倍)

④希釈倍数の変更:いちご(カキヒメコバエ)/4000倍⇒2000~4000倍

なす(アブラムシ類、テトウムシダマシ類)/4000倍⇒2000~4000倍

にんにく(ネギコガ)/4000倍⇒2000~4000倍

食用ぎく(アブラムシ類)/2000倍⇒2000~8000倍

食用ゆり、食用ニバラ(アブラムシ類)/4000倍⇒4000~8000倍

だいず(カメムシ類)/2000倍⇒2000~4000倍

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセチプリドを含む農薬の総使用回数																								
レイシ	カイガラムシ類	2000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内																								
かんしょ	ヨツモンカメノコハムシ	4000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで				3 回以内	散布	3 回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計 1 回以内、 散布は 3 回以内)																					
さやいんげん	アブラムシ類	2000～ 4000 倍									収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内																	
えだまめ	コナジラミ類、アザミウマ類 カメムシ類	4000 倍		収穫 14 日 前まで											3 回以内	散布	3 回以内														
	アブラムシ類、フタスジヒメハムシ マジンクイガ*										2000～ 4000 倍							収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内										
豆類 (種実、ただし、だいず、 いんげんまめを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類	2000～ 4000 倍		収穫 14 日 前まで																		3 回以内	散布	3 回以内							
だいず	マジンクイガ、フタスジヒメハムシ アブラムシ類、コナジラミ類										2000～ 4000 倍							収穫 14 日 前まで							3 回以内	散布	3 回以内				
いんげんまめ	アザミウマ類、カメムシ類	2000 倍		収穫 14 日 前まで																								3 回以内	散布	3 回以内	
なす	コナジラミ類										2000～ 4000 倍							収穫前日 まで													3 回以内
	アザミウマ類、アブラムシ類 テントウムシダマシ類 コナカイガラムシ類	2000 倍		収穫前日 まで																											
いちご	アブラムシ類、カキヒメコバエ チバクロバネキノコバエ				2000 倍	収穫前日 まで	3 回以内				散布							3 回以内 (粒剤の株元散布及び土壌混 和は 合計 1 回以内、 散布及びびくん煙は合計 2 回以 内)													
	コナジラミ類、アザミウマ類	2000～ 4000 倍	収穫前日 まで	3 回以内				散布	3 回以内																						
にんにく	アザミウマ類、アブラムシ類 ネギゴカ*				2000～ 4000 倍	収穫 14 日 前まで				3 回以内		散布	2 回以内																		
食用花 (食用ぎく、食用ニハラ、 食用金魚草、食用プリムラ を除く)	アブラムシ類	8000 倍	収穫 14 日 前まで		3 回以内									散布	2 回以内																
食用ぎく	アザミウマ類	2000～ 8000 倍				収穫前日 まで										3 回以内	散布		2 回以内												
		2000 倍	収穫前日 まで																	3 回以内	散布	2 回以内									
食用ゆり	アブラムシ類	4000～ 8000 倍				収穫 3 日 前まで																	3 回以内	散布	2 回以内						
食用ニハラ		4000～ 8000 倍	収穫 3 日 前まで			3 回以内																				散布	2 回以内				

* 注意事項の変更はありません。

以上