

2022年1月27日

お客様各位

日本農薬株式会社

**農薬登録のご連絡の件**

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

**記**
**1. 新規登録 2022年1月26日付（1件）**
**(1) モンカットプラスフロアブル**
**登録第 24596 号**

有効成分：フルジオキシニル…7.3%

フルトラニル…18.2%

毒性：毒物劇物に該当せず

危険物区分：危険物に該当せず

**○適用病害虫の範囲及び使用方法**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
ばれいしよ	そうか病	100倍	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬	1回	1回
			種いも100kg当り3ℓ			散布		
	黒あざ病	100～200倍	—			種いも瞬間浸漬		
			種いも100kg当り3ℓ			散布		

**○使用上の注意事項**

- ・ 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- ・ 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ・ 所定濃度の薬液で種いも浸漬又は散布し、風乾後植付けること。
- ・ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

**2. 適用拡大 2022年1月26日付 (2件)**
**(1) 日農パーマチオン水和剤**
**登録第 15462 号**

適用病害虫名の追加：とうもろこし/カメシ類 (1000~2000 倍)

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンパレートを 含む農薬の 総使用回数	MEPを 含む農薬の 総使用回数
とうもろこし	アワノメイガ ツマジロクサヨウ アブラムシ類 カメシ類	1000~ 2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内	4 回以内

\* 注意事項の変更はありません。

**(2) 日農ポリオキシ AL 乳剤**
**登録第 12026 号**

①使用時期の設定：ばら、きく、カーネーション/— ⇒ 発病初期

②本剤の使用回数及びポリオキシを含む農薬の総使用回数の設定：ばら、きく、カーネーション/— ⇒ 8 回以内

③使用液量欄を追加し、「100~300ℓ/10a」とする。

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシを 含む農薬の 総使用回数
トマト	葉かび病	1000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
きゅうり	うどんこ病			収穫開始 14 日前まで	2 回以内		2 回以内
いちご				収穫開始 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
なす				収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
ピーマン		収穫開始 14 日前まで	5 回以内	5 回以内			
ばら きく	500~ 1000 倍	100~300 ℓ/10a	発病初期	8 回以内	8 回以内	8 回以内	
カーネーション	斑点病						

\* 注意事項の変更はありません。

以上