

2022年2月25日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記
適用拡大 2022年2月25日付（2剤、3件）

(1) 日農スミレックス水和剤

登録第14500号

- ①作物名の追加:かんきつ(みかんを除く)/灰色かび病(1500~3000倍)、収穫30日前まで、2回以内
- ②使用時期の変更:みかん/開花期 但し、収穫30日前まで ⇒ 収穫30日前まで
- ③使用方法の表記変更:たまねぎ/無人ヘリコプターによる散布 ⇒ 無人航空機による散布

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロシドンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く) みかん	灰色かび病	1500~3000倍	200~700 ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
					3回以内		3回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病 小菌核病	1000倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内		無人航空機による散布
	灰色かび病	16倍	2.4ℓ/10a				

【変更する注意事項】

・本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守る。

- ①散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ②散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。

(2) 日農アグロスリン乳剤
登録第 16591 号
■2013 年 9 月 19 日付申請分

使用時期の変更: ほうれんそう/収穫 21 日前まで ⇒ 収穫 7 日前まで

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメリンを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	ヨウムシ アブラムシ類	2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫 7 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
	ミナキイロアザミウマ	1000 倍					

* 注意事項の変更はありません。

■2016 年 12 月 22 日付申請分

作物名の変更: 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ、ケールを除く)

⇒ 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメリンを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類	2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内

* 注意事項の変更はありません。

以上