

2022年7月6日

お客様各位

日本農薬株式会社

**農薬登録のご連絡の件**

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

**記**

適用拡大 2022年7月6日付(2件)

(1) パレード20フロアブル

登録第24071号

適用病害虫名の追加: なす/黒枯病(2000~4000倍)、ねぎ/白絹病(2000倍)

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルト <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
なす	灰色かび病、すすかび病 菌核病、うどんこ病、黒枯病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱 または、ペーパーポット1冊 (約30×60cm、使用土壌 約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は 1回以内)
	黒斑病、葉枯病 小菌核腐敗病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	さび病、黒腐菌核病、白絹病	2000倍					

\* 注意事項の変更はありません。

(2) メジャーフロアブル

登録第23804号

適用病害虫名の追加: にら/白絹病(2000倍)、にんにく/白絹病(2000倍)

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピコキシトロビン <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
にら	白斑葉枯病 白絹病	2000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
にんにく	白絹病			2000~ 3000倍			
	さび病						

\* 注意事項の変更はありません。

以上