

お客様各位

2022年8月10日

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2022年8月10日付(1件)

(1) サンダーボルト007

登録第21072号

- ① 作物名の変更：果樹類(かんきつ、キウフルーツ、パイナップルを除く)⇒
果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)
- ② 作物名の追加：
 - ・きゅうり、トマト、なす、アスパラガス、ほうれんそう、たらのき、人参、リーフ(葉)、びわ(葉)、ピーマン及びびとうがらし類、にんじん、薬用にんじん、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、らっかせい、かんしょ
- ③ 作物名の変更：たまねぎ(秋播移植栽培)⇒たまねぎ
キャベツ、はくさい ⇒野菜類(きゅうり、トマト、なす、アスパラガス、ほうれんそう、たらのき、人参、リーフ(葉)、びわ(葉)、ピーマン及びびとうがらし類、にんじん、薬用にんじん、だいこん、ねぎ、たまねぎ、豆類(種実)、えだまめ、かんしょを除く)
- ④ 使用時期の変更：
 - ・果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)、かんきつ；収穫7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒収穫7日前まで(雑草生育期)
 - ・だいこん；耕起前またはは種7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒耕起前又はは種7日前まで(雑草生育期)
 - ・ねぎ；耕起前または定植7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期)
 - ・だいず；畦間処理：雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫前日まで⇒畦間処理：雑草生育期 但し、収穫前日まで
は種後出芽前(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒は種後出芽前(雑草発生前)
耕起前またはは種10日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒耕起前又はは種10日前まで(雑草生育期)
 - ・えだまめ；耕起前またはは種10日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)⇒耕起前又はは種10日前まで(雑草生育期)

- ・ きく：耕起または定植前まで（雑草生育期：草丈 50cm 以下）⇒
耕起又は定植前まで（雑草生育期）
- ・ 水田作物（水田畦畔）：収穫 14 日前まで（雑草生育期：草丈 30cm 以下）⇒
収穫 14 日前まで（雑草生育期）
- ・ 水田作物、畑作物（休耕田）：雑草生育期（草丈 50cm 以下）⇒雑草生育期
- ・ 樹木等：雑草生育期（草丈 30cm 以下）⇒雑草生育期
雑草生育期（草丈 50cm 以下）⇒雑草生育期



【変更後】

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 |
|---|------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | |
| 果樹類 (かんきつ、 パイナップルを除く) | — | 一年生及 び多年生 雑草 | 収穫 7 日前まで(雑 草生育期) | 400~ 1000 mℓ/10a | 100ℓ /10a | 3 回 以内 | 雑草 茎葉 散布 | 3 回以内 | 3 回以内 |
| かんきつ | | | | | | | | 5 回以内 | |
| 野菜類 (きゅうり、トマト、 なす、アスパラガス、 ほうれんそう、 たらのき、レタス、 オリーブ(葉)、びわ(葉)、 ピーマン及びとうがらし類、 にんじん、薬用にんじん、 だいこん、ねぎ、 たまねぎ、豆類(種実)、 えだまめ、かんしょを除く) | — | 一年生雑草 | 耕起前又は 定植 7 日前まで (雑草生育期) | 400~600 mℓ/10a | 100ℓ /10a | 1 回 | 雑草 茎葉 散布 | 1 回 | 1 回 |
| らっかせい | | | 耕起前又は は種 7 日前まで (雑草生育期) | | | | | | |
| きゅうり トマト なす アスパラガス ほうれんそう たらのき レタス オリーブ(葉) びわ(葉) | | | 耕起前又は 定植 7 日前まで (雑草生育期) | | | | | 3 回以内 | |
| ピーマン及び とうがらし類 にんじん | | | | | | | | 2 回以内 | |

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | |
| 薬用ニンジン | — | 一年生雑草 | 耕起前又は定植7日前まで (雑草生育期) | 400～600 mL/10a | 1000 /10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 10回以内 (1年間に2回以内) | 1回 |
| だいこん | | | 耕起前又はは種7日前まで (雑草生育期) | | | | | 2回以内 | |
| ねぎ | | | 耕起前又は定植7日前まで (雑草生育期) | | | 3回以内 | | 3回以内 | 3回以内 |
| | | | 定植後畦間処理 :雑草生育期 但し、収穫30日前まで | | | | | | |
| たまねぎ | | | 耕起又は定植7日前まで (雑草生育期) | | | 1回 | | 2回以内 | 4回以内 |
| | | | 定植後畦間処理 :雑草生育期 但し、収穫30日前まで | | | | | | |
| 豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい を除く) | | | 耕起前又はは種10日前まで (雑草生育期) | | | 1回 | | 2回以内 | 1回 |
| だいず | | | 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで | | | 2回以内 | | 4回以内 | 4回以内 |
| | | | は種後出芽前 (雑草生育期) | | | | | | |
| | | | 耕起前又はは種10日前まで (雑草生育期) | | | | | | |
| えだまめ | | | 耕起前又はは種10日前まで (雑草生育期) | | | 1回 | | 3回以内 | 1回 |
| かんしょ | | | 耕起又は挿苗7日前まで (雑草生育期) | | | | | 2回以内 | |

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------|--|------------|-----------------------|---------------------|----------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | |
| きく | — | 一年生雑草 | 耕起前又は定植前まで (雑草生育期) | 400～600 mℓ/10a | 100ℓ/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 水田作物 (水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び多年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期) | | | | | | |
| 水田作物、畑作物 (休耕田) | 休耕田 | 一年生及び多年生雑草 | 雑草生育期 | 500～1000 mℓ/10a | 100ℓ/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木等 | 公園 庭園 堤とう 道路 運動場 宅地 鉄道のり面等 | 一年生及び多年生雑草 | 雑草生育期 | 500～1000 mℓ/10a | | | | | |
| | | スギナ | | 1000～4000 mℓ/10a | | | | | |

【追加する注意事項】

- ・本剤の散布適期は雑草生育期(草丈 30cm 以下)なので、時期を失ないように散布すること。なお、きくに使用する場合又は薬量 1000 mℓ/10a 以上で使用する場合(スギナを除く)は、草丈 50cm 以下が散布適期である。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上