

2022年9月29日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記
適用拡大 2022年9月28日付（3件）

(1) 日農フォース粒剤

登録第18313号

- ① 適用病害虫名の追加:レタス、非結球レタス/コオロギ類(9kg/10a)
- ② 使用時期の変更:レタス、非結球レタス/定植時⇒定植前
- ③ 作物名の統合及び使用時期の変更:小倉はくさい菜(ネキリムシ類、キスジ/ミハムシ/は種前)、
なばな類(キスジ/ミハムシ/は種時)⇒非結球あぶらな科葉菜類(ネキリムシ類、キスジ/ミハムシ/は種前)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルリンを含む農薬の総使用回数
レタス	ネキリムシ類 コオロギ類	9kg/10a	定植前	1回	全面土壌混和	1回
非結球レタス						
非結球あぶらな科葉菜類	ネキリムシ類 キスジ/ミハムシ	4kg/10a	は種前	1回	全面土壌混和	1回

* 注意事項の変更はありません。

(2) ナレート水和剤

登録第17960号

適用病害虫名の追加:レタス/すそ枯病(1000倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病 すそ枯病	1000倍	100~ 300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内

* 注意事項の変更はありません。

(3) 日農イオウフロアブル

登録第 17827 号

- ① 適用病害虫名の追加:りんご／褐斑病(500倍)
- ② 使用時期の変更:
かんきつ／ミカンサビダニ、チャノホコリダニ:「—」⇒「発生初期」
トマト／トマトサビダニ、ミニトマト／トマトサビダニ:「—」⇒「発生初期」
いちご／うどんこ病(500～1000倍)及び芝／さび病(300倍)を除く病害:「—」
⇒「発病前～発病初期」
- ③ 使用液量の欄を追加し、使用液量を以下のとおりとする。
りんご、かんきつ、もも、ネクタリン、あんず、うめ、かき:200～700ℓ/10a
麦類:60～150ℓ/10a
野菜類(すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く)、
すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちご、
ペポかぼちゃ(種子):100～300ℓ/10a
芝:1ℓ/m²
- ④ 使用方法の変更:芝/「1 m²当り 1ℓ散布」⇒「散布」

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 褐斑病	500 倍	200～ 700ℓ/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
かんきつ	ミカンサビダニ チャノホコリダニ	400 倍		発生初期			
もも ネクタリン あんず うめ	黒星病	500 倍		発病前～ 発病初期			
かき	うどんこ病	400 倍					
麦類			赤かび病				
		赤さび病	400 倍	60～ 150ℓ/10a			
野菜類 (すいか、かぼちゃ、トマト、 ミニトマト、ねぎ、わけぎ、 あさつき、いちごを除く)	うどんこ病	500～1000 倍	100～ 300ℓ/10a	発生初期			
すいか かぼちゃ		500 倍					
トマト ミニトマト		500～1000 倍					
ねぎ わけぎ あさつき		うどんこ病					
	さび病	500 倍	発病前～ 発病初期				
いちご	うどんこ病	500～1000 倍	100～ 300ℓ/10a	親株床 初期			
		2000 倍		発病前～ 発病初期			
ぺぽかぼちゃ(種子)		500 倍		発病前～ 発病初期			
芝	さび病	300 倍	1ℓ/㎡	発病初期			

* 注意事項の変更はありません。