

お客様各位

2023年1月11日

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

新規登録 2023年1月11日付 (1件)

(1) ブイゲットパディートフロアブル

登録第 24711 号

有効成分 : シアントラニリプロール 1.87 %
 チアジニル 30.0 %

毒性: 毒物劇物に該当せず

危険物区分: -

○適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネミズウムシ イネトヨイムシ	25～ 50倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	移植3日前 ～移植当日	1回	灌注	1回	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布は 2回以内)
	ニカメイチュウ フタオビコヤガ	25倍						

○使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注すること。
- (3) 軟弱徒長苗、むれ苗又は苗の生育が不良な場合は、薬害を生じるおそれがあるので注意すること。
- (4) きく等の他作物に影響を及ぼすおそれがあるので、その他の作物の栽培予定がある場所では使用しないこと。
- (5) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

適用拡大 2023年1月11日付 (1件)

(1)日農アグロスリン乳剤

登録第 16591 号

作物名の追加:らっかせい/アブラムシ類、2000倍、収穫前日まで、3回以内

えごま(種子)/ウリハムシトキ、2000倍、収穫35日前まで、2回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルトリンを含む農薬の総使用回数
らっかせい	アブラムシ類	2000 倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
えごま(種子)	ウリハムシトキ			収穫 35 日前まで	2 回以内		2 回以内

* 注意事項の変更はありません。

以上