

2023年7月19日

お客様各位

日本農薬株式会社

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2023年7月19日付 (3件)

(1) アプロードフロアブル

登録第 19923 号

- ①適用病害虫名の追加:アカギ^{*}／アカギヒメコバイ幼虫(1000倍)
- ②作物名の変更:樹木類⇒樹木類(アカギ^{*}を除く)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフェンを含む農薬の総使用回数
樹木類 (アカギを除く)	カイガラムシ類幼虫	1000 倍	200～ 700ℓ/10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内
アカギ [*]							

【変更する注意事項】

- ・浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

(2) 日農イオウフロアブル

登録第 17827 号

適用病害虫名の追加:りんご／黒星病(500倍)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 褐斑病 黒星病	500 倍	200～ 700ℓ/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—

* 注意事項の変更はありません。

(3) パレード 20 フロアブル

登録第 24071 号

 ①使用方法の追加:はなやさい類(フロコリーを除く):16倍(1.6ℓ/10a)、20倍(2.0ℓ/10a)、32倍(3.2ℓ/10a)、
 無人航空機による散布

②作物名の統合:「はなやさい類(フロコリーを除く)」「フロコリー」⇒「はなやさい類」

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000～ 4000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内 (灌注は 1 回以内)
		16 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		20 倍	2.0ℓ/10a				
		32 倍	3.2ℓ/10a				
	菌核病	100 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱 または、ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	

* 注意事項の変更はありません。

以上