

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2024年2月28日付（1件）

(1)日農ハチハチフロアブル

登録第 21055 号

適用害虫名の変更:かんきつ/ミカンサビダニ ⇒ サビダニ類

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
かんきつ	サビダニ類	2000～3000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 チャノホリダニ カネタタキ	2000倍					
	アザミウマ類	1000～2000倍					
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫 ナメクジ類	1000倍					

【追加する注意事項】

- ・ 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

新規登録 2024年2月28日付(1件)

(1)ネマクリーンフロアブル

登録第 24842 号

有効成分 :フルオピラム・・・34.4%

毒性 :毒物劇物に該当せず

危険物区分: -

○適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ネコフセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	植付前	1回	全面散布後 土壌混和	1回
		200倍	50ℓ/10a				
かんしょ	ネコフセンチュウ	400倍	100ℓ/10a				
		200倍	50ℓ/10a				
		16倍	4ℓ/10a				
にんじん	ネコフセンチュウ	400倍	100ℓ/10a				
		200倍	50ℓ/10a				
だいこん	ネコフセンチュウ ネグサレセンチュウ	400倍	100ℓ/10a				
		200倍	50ℓ/10a				

○注意事項

- ・ 散布液調製時には、容器を数回振ってよく攪拌してから薬量を計ること。
- ・ 調製した薬液はよく攪拌し、調製した当日に使い切ること。
- ・ 本剤を無人航空機による全面散布後土壌混和に使用する場合は次の注意事項を守ること。
 - 1) 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - 2) 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- ・ 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する場合に桑葉にかからないようにすること。
- ・ 間引き菜、つまみ菜に使用しないこと。
- ・ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・ 誤飲などのないよう注意すること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ・ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ・ 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。

以上