

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

新規登録 2024年3月4日付（1件）

(1) 日農フィールドマストフロアブル

登録第 24849 号

有効成分 : ジクロロメチアス[®]・・・18.4%

毒性 : 毒物劇物に該当せず

危険物区分: ー

○適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメチアス [®] を含む農薬の総使用回数
結球あぶらな科 葉菜類 (キャベツを除く)	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 ハスモンヨウ、ハイマダラノメイガ	4000 倍	100～ 300ℓ/10a	収穫前日 まで	2 回 以内	散布	2 回 以内
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 ハスモンヨウ、ハイマダラノメイガ、 ウワバチ類			収穫前日 まで			
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、 カブラハバチ			収穫 3 日前 まで			
はなやさい類	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 ハスモンヨウ、ハイマダラノメイガ			収穫前日 まで			
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつなを除く)	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 ハスモンヨウ、キスジノミハムシ						
こまつな	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 ハスモンヨウ、キスジノミハムシ、 ナメグリハバチ						
レタス類	ハスモンヨウ、ヨウムシ、ナメグリハバチ						
かぶ	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、 キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、 カブラハバチ						

○注意事項

- ・ 使用する前によく振ること。
- ・ 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- ・ 間引き菜、つまみ菜に使用しないこと。
- ・ みずかけな(水掛菜)に使用する場合、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用后 14 日間は入水しないこと。
- ・ 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにすること。
- ・ 散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄すること。また、洗浄した廃液は河川等に流さないこと。
- ・ 空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ・ 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましい。
- ・ 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用すること。
- ・ 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
- ・ 本剤は衣服(白衣)などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
- ・ アレルギー性反応を起こすおそれがある。
- ・ 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- ・ 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

以上