

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2024年4月10日付 (2件)

(1) エコパートフロアブル

登録第 20184 号

- ①使用時期の変更:小麦(秋播)/小麦2~4葉期(広葉雑草2~4葉期)但し、収穫45日前まで
⇒小麦2~6葉期(広葉雑草2~4葉期)但し、収穫45日前まで
- ②適用地帯変更:こんにやく/全域 ⇒ —

【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用地帯	ピラフルフェンエチル を含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量				
小麦 (春播)	一年生 広葉雑草	小麦2~4葉期 (広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで	50~100 ml/10a	100ℓ/10a	2回以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	北海道	2回以内
小麦 (秋播)		小麦2~6葉期 (広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで						
		小麦止葉抽出前まで (春期広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで	50~75 ml/10a					
		小麦節間伸長開始期まで (広葉雑草2~4葉期、 ヤムグウ2~6節期) 但し、収穫45日前まで	50~100 ml/10a					
大麦		大麦節間伸長開始期まで (広葉雑草2~4葉期) 但し、収穫45日前まで						
こんにやく	植付後~萌芽前 (広葉雑草2~4葉期)				—			

* 注意事項の変更はありません。

(2) ナレート水和剤

登録第 17960 号

①適用病害虫名の追加:レタス/べと病(1000倍)

②作物名の追加:非結球レタス(軟腐病、腐敗病、斑点細菌病、すそ枯病、べと病)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシニック酸を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
レタス	軟腐病 腐敗病	1000倍	100~ 300L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	5 回以内
非結球レタス	斑点細菌病 すそ枯病 べと病			収穫 30 日前 まで				

【追加および変更する注意事項】

- ・ 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- ・ はくさい、レタス、非結球レタス、キャベツに対して使用する場合、収穫間際の散布では収穫物に汚れを生じることがあるので注意すること。
- ・ はくさい・たまねぎ・レタス・非結球レタス・キャベツ・ブロッコリー・だいこん・ねぎの軟腐病、はくさいのべと病、レタス・非結球レタスの斑点細菌病及び腐敗病並びににんにくの春腐病に使用する場合、発病後の散布では効果が劣る場合があるので、発病前あるいは発病初期に予防的に散布すること。
- ・ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上

2024年4月11日

お客様各位



「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙「スピノエース™フロアブル」適用拡大認可のご案内	3枚
別紙「ダブルシューター™SE」適用拡大認可のご案内	3枚

以上

2024年4月10日

お客様 各位

コルテバ・ジャパン株式会社
マーケティング本部
本部長 三村 直人「スピノエース™フロアブル」 適用拡大認可のご案内

拝啓 立冬の候、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、園芸用殺虫剤「スピノエース™フロアブル」の適用拡大申請が別紙のとおり4月10日付で認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、お願い致します。

敬具

(別紙1)

農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第20174号

名 称： スピノエース™フロアブル

以下の内容が適用拡大となりました。

- ・作物名「茶」に適用病害虫名「チャドクガ」及び「マダラカサハラハムシ」を追加する。

【追加・変更事項】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	スピノト [®] を 含む農薬の 総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホリガ チャノキイロアザミウマ チャドクガ	2000～ 4000倍	200～ 400L/10a	摘採 7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	マダラカサハラハムシ	2000倍					
	チャハマキ ヨモギエダシヤク	4000倍					

以上

2024年4月10日

お客様 各位

コルテバ・ジャパン株式会社
マーケティング本部
本部長 三村 直人

「ダブルシューター™SE」 適用拡大認可のご案内

拝啓 立冬の候、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、園芸用殺虫剤「ダブルシューター™SE」の適用拡大申請が別紙のとおり4月10日付で認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、お願い致します。

敬具

(別紙1)

農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第24055号

名称： ダブルシューター™SE

以下の内容が適用拡大となりました。

- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「アザミウマ類」に使用方法「常温煙霧」を追加する。

【追加・変更事項】(常温煙霧を追加する作物のみ抜粋)

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサトを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	アザミウマ類	250mL/ 10a	10L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	常温煙霧	—	2回以内

今回、使用方法常温煙霧の拡大に伴い、農薬登録申請書第8項および第9項に以下を新たに追加しました。

8. 使用上の注意事項

(4) ハウスなどの常温煙霧用として使用する場合は下記の注意事項を守ること。

- ①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。

特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

- ②作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密閉すること。

- ③煙霧が直接植物体に当たると葉や果実に汚れを生じるおそれがあるので、

施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が作物体に直接当たらないよう措置をとること。

9. 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

(5) 常温煙霧中はハウス内に入らないこと。

また常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分に換気した後に入室すること。

以上