

お客様各位



## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

適用拡大 2024年12月11日付(2件)

## (1) 日農ラッソー乳剤

登録第10777号

- ①作物名「さとうきび(株出)」を追加
- ②作物名「さとうきび(春植又は夏植)」の適用雑草名に「カワリハトウダイ」を追加
- ③作物名「さとうきび(春植又は夏植)」の使用時期「移植後(雑草発生前)但し植付90日後まで」を「植付後(雑草発生前)但し植付90日後まで」に変更

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	アラクロールを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
さとうきび (株出)	カワリハトウダイ	株出管理後 90日まで (雑草発生前)	全土壌	400~ 600 mℓ /10a	100ℓ /10a	2回以内	全面 土壌 散布	九州 沖縄	2回以内
さとうきび (春植又は夏植)	一年生雑草 カワリハトウダイ	植付後 (雑草発生前) 但し植付 90日後まで							

## 【変更する注意事項】

- ・ﾀﾞﾝ科、アカガ科などの広葉雑草には効果が劣るのでイネ科雑草優占ほ場で使用すること。
- ・こまつなを使用する場合
  - 2) は種時の覆土は1~2cmとすること。
- ・ソルガムを使用する場合
  - 2) は種時の覆土は3cm以上とすること。また散播では使用しないこと。
- ・はとむぎを使用する場合
  - 2) は種時の覆土は3cm以上とすること。

(2) アクセルフロアブル

登録第 22461 号

使用方法の追加:

- ・かんきつ:12倍(4~8ℓ/10a)、15倍(8~10ℓ/10a)、24倍(10~16ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・うめ/ケシスイ類:1000倍、100~300ℓ/10a、全面土壌散布

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフルジンを 含む農薬の 総使用回数	
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	収穫 7日前 まで	3回以内	主幹から 株元に散布	3回以内	
		1000~4000倍				散布		
	アゲハ類 ヨモギエダシヤク クワミハムシ ミカンガタマムシ	1000~2000倍	200~700ℓ/10a			散布		
		ゴマダラカミキリ アゲハ類 ヨモギエダシヤク クワミハムシ ミカンガタマムシ	12倍			4~8ℓ/10a		無人航空機 による散布
			15倍			8~10ℓ/10a		
	24倍	10~16ℓ/10a						
うめ	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫 前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
		1000~2000倍						散布
	ケシスイ類	1000倍				100~300ℓ/10a		全面土壌散布

【追加する注意事項】

- ・うめに全面土壌散布する場合は、過度な降雨等により土壌に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさけること。

以上