

お客様各位



## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

適用拡大 2025年2月12日付（4件）

## (1) 日農ヒエクリーンバサグラン粒剤

登録第 23951 号

- ①作物名「移植水稻」の使用時期「移植後 15 日～ルイ 4 葉期 但し、収穫 60 日前まで」を「移植後 15 日～ルイ 4 葉期 但し、収穫 45 日前まで」に変更
- ②作物名「直播水稻」の使用時期「稲 3 葉期～ルイ 4 葉期 但し、収穫 60 日前まで」を「稲 3 葉期～ルイ 4 葉期 但し、収穫 45 日前まで」に変更
- ③移植水稻および直播水稻における適用雑草名のうち、「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草、 マツバイ、ホタルイ、 ウリカワ、ミスガヤツリ、 ヘラオモダカ、オモダカ、 クログワイ、シズイ	移植後15日～ ルイ4葉期 但し、収穫45日前まで	3kg/10a	1回	ごく浅く 湛水して 散布
直播水稻	一年生雑草、 マツバイ、ホタルイ	稲3葉期～ ルイ4葉期 但し、収穫45日前まで			

ピリミバクメチルを含む農薬の総使用回数	ベンゾゾンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

\* 注意事項の変更はありません。

(2) 日農ロックス

登録第 22896 号

- (ア) 作物名「にんじん」の使用時期を「にんじん 3～5 葉期 但し、収穫 30 日前まで(雑草発生始期)」から「にんじん 3 葉期以降 但し、収穫 30 日前まで」に変更し、  
使用方法を「全面土壌散布」から「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更
- (イ) 作物名「にんじん」のリニロンを含む農薬の総使用回数を  
「2 回以内(は種直後は 1 回以内、にんじん 3～5 葉期は 1 回以内)」から  
「2 回以内(は種直後は 1 回以内、にんじん 3 葉期以降は 1 回以内)」に変更

【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	リニロンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量			
にんじん	一年生 雑草	は種直後	100～200g /10a	70～150ℓ /10a	1 回	全面土壌散布	2 回以内 (は種直後は 1 回以内、 にんじん 3 葉期以降は 1 回以内)
		にんじん 3 葉期以降 但し、収穫 30 日前まで	100～150g /10a			雑草茎葉散布 又は全面散布	

【削除する注意事項】

- ・生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を失ないように散布すること。
- ・雑草茎葉兼土壌散布では、本剤の散布適期は雑草生育期であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失ないように散布すること。

作物名	雑草の草丈
だいず、えだまめ	15cm 以下
アスパラガス、かんしょ	10cm 以下

【追加する注意事項】

- ・本剤は広葉雑草に比べイネ科雑草に対してはやや効果が劣るので、イネ科雑草が優占するほ場ではイネ科雑草に有効な除草剤と組み合わせて使用すること。
- ・生育が進んだ雑草には効果が劣るので一年生広葉雑草は草丈 10cm 以下、一年生イネ科雑草は発生始期までに時期を失ないように散布すること。

(3) カイタック乳剤

登録第 17904 号

- ・ 作物名「にんじん」のリニロンを含む農薬の総使用回数を  
「2回以内(は種直後は1回以内、にんじん3~5葉期は1回以内)」から  
「2回以内(は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内)」に変更

【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	適用 土壌	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	適用 地帯
				薬量	希釈 水量			
にんじん	一年生 雑草	は種直後 (雑草発生前)	全土壌	300~ 500 ml /10a	70~ 100ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	全域

ペンディメタリンを含む 農薬の総使用回数	リニロンを含む 農薬の総使用回数
1回	2回以内 (は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内)

\* 注意事項の変更はありません。

(4) カイタック細粒剤 F

登録第 18414 号

- ・ 作物名「にんじん」のリニロンを含む農薬の総使用回数を  
「2回以内(は種直後は1回以内、にんじん3~5葉期は1回以内)」から  
「2回以内(は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内)」に変更

【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	適用 土壌	使用量	本剤の 使用 回数	使用 方法	適用 地帯
にんじん	一年生 雑草	は種直後 (雑草発生前)	砂壤土 ~壤土	3~5kg /10a	1回	全面 土壌 散布	全域

ペンディメタリンを含む 農薬の総使用回数	リニロンを含む 農薬の総使用回数
1回	2回以内 (は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内)

\* 注意事項の変更はありません。

以上