

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2025 年 4 月 9 日付 (1 件)

(1) アクセルフロアブル

登録第 22461 号

使用方法の追加:

- ・とうもろこし/アワノメイガ: 16 倍 (1.6~3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・とうもろこし/ツマジロクサヨトウ: 16 倍 (3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・飼料用とうもろこし(子実)/アワノメイガ: 16 倍 (1.6~3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・飼料用とうもろこし(子実)/ツマジロクサヨトウ: 16 倍 (3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・だいこん/キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ハイマダラノメイガ、ヨウムシ、カブラハバチ類: 8 倍 (0.8ℓ/10a)、
10 倍 (1.0ℓ/10a)、16 倍 (1.6ℓ/10a)、20 倍 (2.0ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・えだまめ、だいず/ハスモンヨトウ: 8 倍 (0.8~1.6ℓ/10a)、10 倍 (1.0~2.0ℓ/10a)、
16 倍 (1.6~3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布
- ・えだまめ、だいず/フタスジヒメハムシ: 8 倍 (1.6ℓ/10a)、10 倍 (2.0ℓ/10a)、16 倍 (3.2ℓ/10a)、
無人航空機による散布
- ・さといも/ハスモンヨトウ: 10 倍 (1.0~1.6ℓ/10a)、20 倍 (2.0~3.2ℓ/10a)、無人航空機による散布

* 注意事項の変更はありません。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	メタフルゾンを含 む農薬の 総使用回数			
とうもろこし	アワノメイガ [®]	1000~2000 倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内			
		16 倍	1.6~3.2ℓ/10a			無人航空機に よる散布				
	ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100~300ℓ/10a			散布				
		16 倍	3.2ℓ/10a			無人航空機に よる散布				
飼料用 とうもろこし (子実)	アワノメイガ [®]	1000~2000 倍	100~300ℓ/10a			収穫 7 日 前まで		2 回 以内	散布	2 回 以内
		16 倍	1.6~3.2ℓ/10a						無人航空機に よる散布	
	ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100~300ℓ/10a						散布	
		16 倍	3.2ℓ/10a						無人航空機に よる散布	
だいこん	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000 倍	100~300ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内		散布		2 回 以内	
	ハイマダラノメイガ [®] ヨウムシ カブラハバチ類	1000~2000 倍								
	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	8 倍	0.8ℓ/10a							
	ハイマダラノメイガ [®] ヨウムシ カブラハバチ類	10 倍	1.0ℓ/10a							
	16 倍	1.6ℓ/10a								
	20 倍	2.0ℓ/10a								
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ	1000~2000 倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回 以内			
		8 倍	0.8~1.6ℓ/10a			無人航空機に よる散布				
		10 倍	1.0~2.0ℓ/10a							
		16 倍	1.6~3.2ℓ/10a							
	フタスジヒメハムシ	1000 倍	100~300ℓ/10a			散布				
		8 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機に よる散布				
		10 倍	2.0ℓ/10a							
16 倍	3.2ℓ/10a									
さといも	ハスモンヨトウ	1000~2000 倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回 以内			
		10 倍	1.0~1.6ℓ/10a			無人航空機に よる散布				
		20 倍	2.0~3.2ℓ/10a							

以上