

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2025年12月16日付 (1件)

(1) 日農ポリオキシンAL水和剤

登録第 9021号

- ・「ポリオキシンを含む農薬の総使用回数」を「ポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数」に変更
- ・りんごのポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数を「5回以内(散布は3回以内)」から「3回以内」に変更
- ・なしのポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数を「5回以内(ミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内)」から「5回以内」に変更

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数	
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 赤衣病	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	黒斑病 うどんこ病 褐色斑点病			収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
ぶどう	灰色かび病			収穫60日前まで				
みかん	赤衣病			収穫14日前まで				
メロン	うどんこ病			収穫前日まで	5回以内 (塗布は1回以内)		5回以内 (塗布は1回以内)	
きゅうり								
いちご	灰色かび病 うどんこ病			収穫開始14日前まで	3回以内		3回以内	
トマト	灰色かび病 葉かび病			収穫前日まで				
レタス	菌核病	500倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内	
にんじん	黒葉枯病			収穫7日前まで				
ねぎ	黒斑病 ネギアサミウマ	1000倍	500~750倍	収穫14日前まで 発生初期 但し、収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病 ネギアサミウマ			収穫3日前まで				
からまつ	先枯病	500~1000倍	300~700ℓ/10a	—	8回以内		8回以内	

* 注意事項の変更はありません。

以上