

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

1. 適用拡大 2026年3月18日付 (1件)

(1) 日農スミチオン乳剤

登録第 5042 号

作物名「かんしょ」に適用病害虫名「ムツジアシナガゾウムシ」を追加

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	MEPを含む 農薬の 総使用回数
かんしょ	アブラムシ類 イモコガ ムツジアシナガゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ	1000倍	100~300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	5回以内	散布	5回以内

* 注意事項の変更はありません。

2. 使用制限 2026年3月18日付 (3件)

(1) ドキリンフロアブル

登録第 18230 号

使用時期の変更: なし/収穫3日前まで ⇒ 収穫21日前まで

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を含む 農薬の 総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、 輪紋病、枝枯細菌病	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫21 日前まで	9回以内	散布	12回以内(塗布は3回以 内、散布は9回以内)

* 注意事項の変更はありません。

(2) オキシンドー水和剤 80

登録第 15664 号

- ①作物名の削除:りんご/マルメロ/かりん
- ②希釈倍数の変更:なし/黒斑病、黒星病/1200~2000 倍 ⇒ 1400~2000 倍
- ③希釈倍数の変更:なし/輪紋病/1200~1600 倍 ⇒ 1400~1600 倍
- ④使用時期の変更:なし/収穫 3 日前まで ⇒ 収穫 21 日前まで

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	1400~2000 倍	200~700ℓ /10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内(塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内)
	輪紋病	1400~1600 倍					

【削除する注意事項】

りんごに使用する場合、サビ果の発生を多くする場合がありますので、落花直後から落花 20 日後頃まで使用をさけること。また、樹勢の弱い場合には連用散布すると生理落葉を助長する事例もあるので、連用は避けることが望ましい。特にゴールデン及びゴールデンからの育成品種には注意すること。

(3) オキシラン水和剤

登録第 21247 号

- ①希釈倍数の変更:作物名「りんご」の希釈倍数「500~800 倍」を「700~800 倍」に変更
- ②希釈倍数の削除:作物名「りんご」の希釈倍数「500~600 倍」を削除
- ③使用時期の変更:なし/収穫 3 日前 ⇒ 収穫 21 日前まで

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	700~800 倍	200~700ℓ/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	6 回以内	7 回以内(塗布は 3 回以内、散布は 4 回以内)
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500~600 倍		収穫 21 日前まで	9 回以内			
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500 倍						

* 注意事項の変更はありません。

2026年3月19日

お客様各位



「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙「コテツ®フロアブル」 適用拡大認可のご案内 1 枚

以上

適用拡大登録のご案内

令和 8 年 3 月

農林水産省登録

第19184号

殺虫剤 **コテツ[®]フロアブル**

クロルフェナピル水和剤

令和8年3月18日付けで、以下のとおり変更登録されました。

- 作物名「かんしょ」に適用病害虫名「ムツジアシナガゾウムシ」、希釈倍数2000倍が追加登録されました。

【変更後（**太字下線部**）】（該当する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ、 ハダニ類、 ムツジアシナガゾウムシ	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	ヨツモンカメノコバシ、 シロイチモジトウ	2000～ 4000倍					
	ハスモンヨトウ、 シロイチモジトウ	16倍	1.6 L/10a			無人航空機 による散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。