

お客様各位



## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

適用拡大 2026 年 4 月 22 日付 (1 件)

(1) 日農スプレーオイル

登録第 10601 号

使用時期の追加:りんご(カイガラムシ類)/50 倍、展葉期

## 【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名                      | 希釈倍数    | 使用液量             | 使用時期                | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マン油を含む農薬の総使用回数 |
|-----|-----------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------|----------------|
| りんご | カイガラムシ類<br>ハダニ類<br>ハダニ類の越冬卵 | 25~50 倍 | 200~700ℓ<br>/10a | 発芽前                 | -       | 散布   | -              |
|     | ハダニ類                        | 50 倍    |                  | 芽出直前直後              |         |      |                |
|     |                             | 100 倍   |                  | 展葉期<br>(発芽後 2 週間まで) |         |      |                |
|     |                             | 200 倍   |                  | 展葉期<br>(発芽後 3 週間まで) |         |      |                |
|     | カイガラムシ類                     | 50 倍    |                  | 展葉期                 |         |      |                |

## 【追加する注意事項】

・りんごの展葉期に使用する場合は下記の事項に注意すること。

- (1) 展葉期の散布では葉の周囲が褐変する薬害が生じることがあるので遅れて散布すると、葉だけでなく花弁にも薬害が生じる可能性があるため注意すること。
- (2) 樹勢が弱っている場合は薬害が出やすいので散布をさけること。
- (3) カイガラムシ類の防除を目的とする場合はナシマルカイガラムシを主体に散布すること。
- (4) フェンハレートを含まない農薬との混用散布はモザイク症状の薬害が発生するおそれがあるため注意すること。

・りんごの赤果肉品種では、展葉期以降に散布すると葉に赤点などの薬害が現れることがあるため、散布をさけること。

以上

2026年4月23日

お客様各位



## 「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。  
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙 「ゾーベックエンテクタ™SE」 適用拡大認可のご案内

2枚

以上

2026年4月22日

お客様 各位

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社  
マーケティング本部

## 「ゾーベックエンテクタ™SE」登録内容変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、園芸用殺菌剤「ゾーベックエンテクタ™SE」の登録内容変更申請が別紙のとおり、4月22日付にて認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

(別紙 1)

記

1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第 2 4 7 2 8 号

名 称：ゾーベックエンテクタ S E

2 変更の内容

農薬登録申請書第 6 項を変更し、変更後のとおりとする。

(1) 作物名「ほうれんそう」を追加する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

| 作物名    | 適用<br>病害虫名 | 希釈<br>倍数 | 使用液量             | 使用時期          | 本剤の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | アミルプロム<br>を含む農薬<br>の<br>総使用回数 | キサチアピプロリン<br>を含む農薬の<br>総使用回数 |
|--------|------------|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| ほうれんそう | べと病        | 3000 倍   | 100~300<br>L/10a | 収穫 7 日<br>前まで | 2 回<br>以内       | 散布       | 2 回以内                         | 2 回以内                        |

以上