

お客様各位



## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

適用拡大 2026年5月13日付(3件、2剤)

(1)日農アグロスリン水和剤

登録第16585号

【2025年9月11日付申請】

- ・作物名「しょうが」を追加
- ・作物名「かんしょ」および「かんしょ(茎葉)」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に変更
- ・作物名「なす」および「きゅうり」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更
- ・作物名「かんきつ」および「ぶどう」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シベルマトリンを含む 農薬の総使用回数	
しょうが	アワノメイガ	1000倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	
かんしょ	アザミウマ類 コナジラミ類 ハムシ類 イモコガ エビガラスズメ ヨウムシ			1000~ 2000倍	収穫7日 前まで		5回以内	2回以内
	アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ							
かんしょ(茎葉)	アザミウマ類 コナジラミ類 ハムシ類 イモコガ エビガラスズメ ヨウムシ	1000~ 2000倍		収穫前日 まで	5回以内		2回以内	5回以内
	アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ							
トマト	アブラムシ類	2000倍		収穫前日 まで	5回以内		2回以内	2回以内
ミニトマト	コナジラミ類							
なす きゅうり	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	1000倍			5回以内	5回以内		

かんきつ	アザミウマ類 アブラムシ類 カメムシ類 アケビコハ ヒメグサ ミカンハエ成虫	2000倍	200~700 ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
ぶどう	コガネムシ類 フタテンヒメコバエ	1000~ 2000倍		収穫21日前まで	5回以内		
	アザミウマ類	1000~ 3000倍					

【2026年2月4日付申請】

- ・作物名「うめ」に適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」を追加

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハルマトリンを含む農薬の総使用回数
うめ	アブラムシ類 クビアカツヤカミキリ モモヒメコバエ	2000倍	200~700 ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内

\* 注意事項の変更はありません。

(2) 日農アグロスリン乳剤

登録第16591号

- ・作物名「だいず」の適用病害虫名「ジャガ イヒゲナガアブラムシ」を「アブラムシ類」に変更
- ・作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「ネギハメグサ」を「ハメグサ類」に変更し、使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「2.4ℓ/10a」を「2.4~3.2ℓ/10a」に変更
- ・作物名「ねぎ」および「わけぎ」の適用病害虫名「ネギハメグサ」を「ハメグサ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更
- ・作物名「にら」、「にら（花茎）」、「葉にんにく」および「らっきょう」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更
- ・作物名「トマト」の適用病害虫名「オシロイタマシ」を「オシロイタマシ類」に変更
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「オシロイタマシ」を「オシロイタマシ類」に、「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更
- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「オシロイタマシ」を「オシロイタマシ類」に、「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハメグサ」を「ハメグサ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更
- ・作物名「すいか」の適用病害虫名「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更
- ・作物名「メロン」の適用病害虫名「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハメグサ」を「ハメグサ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ミナキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更し、適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加
- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ マダシクイガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ	48倍	2.4～3.2 ℓ/10a		5回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ			1000倍		100～300 ℓ/10a	収穫3日 前まで
	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ネギコガ	1000～ 2000倍					
わけぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ネギコガ	1000～ 2000倍					
にら	アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 ハモグリバエ類 ヨウムシ類 ネギコガ	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
にら (花茎)							
葉にんにく	アザミウマ類	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫3日 前まで	5回以内	散布	5回以内
らっきょう							
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
なす	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類						
きゅうり	アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
	アブラムシ類 コナジラミ類	1000～ 2000倍					
すいか	アザミウマ類 アブラムシ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	5回以内	散布	5回以内
メロン	アザミウマ類 ハモグリバエ類 アブラムシ類						
ほうれん そう	アザミウマ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	5回以内	散布	5回以内
	アブラムシ類 ハクサイダニ ヨウムシ	1000～ 2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シペルメリンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	アザミウマ類 アブラムシ類 カメムシ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ミカンハモグリガ	1000～ 2000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

\* 注意事項の変更はありません。

使用制限 2026年5月13日付(1件)

(1)マイリノー

登録第 12844 号

適用農薬名「摘果剤(NAC 水和剤)」を削除

\* 注意事項の変更はありません。

以上