

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2026年7月8日付（4件）

(1) ナレート水和剤

登録第 17960 号

適用病害虫の追加: フロコリー／花蕾腐敗病

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリ尼克酸を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
フロコリー	軟腐病、黒すす病、花蕾腐敗病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内

* 注意事項の変更はありません。

(2) パレード 15フロアブル

登録第 24072 号

①適用病害虫名の追加: おうとう/褐色せん孔病

②使用液量の記載変更: かんきつ／4～5ℓ/10a、8～10ℓ/10a ⇒ 4.0～5.0ℓ/10a、8.0～10ℓ/10a

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルトを含む農薬の総使用回数
おうとう	灰星病	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	幼果菌核病 褐色せん孔病	2000倍					
かんきつ	灰色かび病	20倍	4.0～5.0ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		40倍	8.0～10ℓ/10a				
	灰色かび病 そうか病 黒点病	2000～3000倍	200～700ℓ/10a			散布	

* 注意事項の変更はありません。

(3) 日農ハチハチフロアブル

登録第 21055 号

希釈倍数の変更:かんきつ/ナメジ類の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
かんきつ	サビダニ類	2000～3000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタキ	2000倍					
	アザミウマ類 ナメジ類	1000～2000倍					
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫	1000倍					

* 注意事項の変更はありません。

(4) 日農ハチハチ乳剤

登録第 24193 号

- ①適用病害虫の追加:キャベツ/シロイモジヨトウ(1000倍)
- ②適用病害虫の追加:キャベツ/ナメジ類(1000倍)
- ③適用病害虫の追加:にら/ネギアザミウマをアザミウマ類に変更

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類 シロイモジヨトウ ナメジ類	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類	1000～2000倍					
にら	アザミウマ類	1000倍	100～300ℓ/10a		1回	散布	1回

* 注意事項の変更はありません。

以上。