

日農マラソン乳剤

[マラソン乳剤]

農林水産省登録 第2280号

有効成分 マラソン…50.0%

性状 黄褐色澄明可乳化油状液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
500ml×20 RACコード：殺虫[1B]

危険物：4-2石-III

有効年限：3年

包装：

特長

- 稲、果樹、野菜の広範囲の害虫に高い効果があり、速効的である。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- しゅんぎくには使用しない。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさける。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ミカンキロアザミウマの防除に使用する場合、多発生時には、効果が劣ることがあるので、初発生をみたら直ちに散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意する。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意する。
- 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されている。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

- 散布後は水管理に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (なつみかんを除く)	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日前 まで	5回以内	散布	5回以内
	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 アオバハゴロモ	1000～ 2000倍					
りんご	ハダニ類 リンゴワタムシ アブラムシ類	1000～ 3000倍					5回以内 (休眠期から 芽出直後ま では1回以 内)
	ナシヒメシンクイ ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
	モモシンクイガ	1000倍					
なし	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍					5回以内 (休眠期は1 回以内)
	ナシヒメシンクイ ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
もも	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍		5回以内			
	ナシヒメシンクイ カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
	モモシンクイガ	1000倍					
ぶどう	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍		6回以内			
	ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
	キンケクチブトゾウムシ成虫	1000倍					
かき	ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000～ 2000倍		4回以内			
	イラガ類	1000～ 3000倍					
おうとう	ハマキムシ類	1000～ 2000倍		5回以内 (休眠期の50 倍希釈散布 は1回以内)			
	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍					
うめ	アブラムシ類	1000～ 2000倍	5回以内				
	ハマキムシ類 カイガラムシ類						
びわ	ビワキジラミ	2000倍	5回以内				
	アブラムシ類	2000～ 3000倍					
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	2000倍	60～ 150ℓ /10a				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数		
だいず えんどうまめ あずき	ハダニ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コガネムシ類	1000～ 3000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内		
	マメシクイガ ハモグリバエ類	1000倍							
いんげんまめ	ハダニ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コガネムシ類	1000～ 3000倍							
	マメシクイガ ハモグリバエ類	1000倍							
	インゲンテントウ	1000～ 2000倍							
豆類 (未成熟)	ハダニ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コガネムシ類	1000～ 3000倍							
	ハモグリバエ類 マメシクイガ カメムシ類	1000倍							
	インゲンテントウ	1000～ 2000倍							
きゅうり メロン うり類 (漬物用)	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍							
	ウリハムシ	1000倍							
すいか	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍		収穫前日 まで	5回以内	5回以内	5回以内		
	ウリハムシ	1000倍							
かぼちゃ	ハダニ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍							
	ウリハムシ	1000倍							
にがうり	アブラムシ類	1000倍							
トマト ピーマン	ハダニ類 アブラムシ類	2000～ 3000倍							
なす			6回以内					6回以内	
キャベツ はくさい	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～ 3000倍	5回以内					5回以内	5回以内
	カブラハバチ アオムシ	1000倍							
カリフラワー ブロッコリー	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～ 3000倍	収穫3日前 まで					5回以内	5回以内
	カブラハバチ アオムシ	1000倍							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	
だいこん	アブラムシ類	1000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内	
	ナモグリバエ カブラハバチ アオムシ	1000倍						
かぶ	アブラムシ類	1000～3000倍			4回以内		4回以内	4回以内
	ナモグリバエ カブラハバチ アオムシ	1000倍						
いちご	ハダニ類 アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内	
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍						
ねぎ	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～3000倍		収穫7日前まで	6回以内		6回以内	
	ネギハモグリバエ	1000倍						
たまねぎ	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～3000倍		収穫14日前まで	4回以内		4回以内	
	ハモグリバエ類	1000倍						
にんじん	アブラムシ類 キアゲハ ヤサイゾウムシ	2000～3000倍		収穫14日前まで	4回以内		4回以内	
ごぼう	アブラムシ類			収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
ほうれんそう				収穫14日前まで	4回以内		4回以内	
レタス				収穫3日前まで	5回以内		5回以内	
あしたば				ウドノメイガ	1000倍		収穫7日前まで	3回以内
食用ぎく	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内	
よもぎ				収穫7日前まで	1回		1回	
花き類・観葉植物	ハダニ類 アブラムシ類	2000～3000倍		発生初期	6回以内		6回以内	
きく	ヨトウムシ類							
サルビア	オンブバッタ							
マリーゴールド	ハモグリバエ類							
たばこ	アブラムシ類 ヤサイゾウムシ	1000倍		25～180ℓ/10a	収穫10日前まで		2回以内	2回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

