

# ハチハチ乳剤

[トルフェンピラド乳剤]

農林水産省登録 第20818号

有効成分 トルフェンピラド…15.0%

性状 黄色澄明可乳化油状液体

安全性：劇物 危険物：4-3石-III（非水溶性） 有効年限：5年 包装：500ml×20 RACコード：殺虫[21A]殺菌[39]

## 特長

- 新しい構造を有することから、既存の殺虫剤に感受性が低下した害虫に対しても有効です。
- 殺虫スペクトルが広く、難防除害虫に高い効果を示します。
- 殺菌作用を有する殺虫剤として、同時防除に寄与します。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- ダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにいねいに散布する。
- はくさい、きゅうり、かぶ、にがうり、レタスの幼苗期に使用すると薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 周辺作物（セルリーの幼苗期、こまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜及びばら）にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう十分注意して散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- マルハナバチに対して影響があるので注意する。
- 天敵昆虫に対して影響があるので注意する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。

- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

### ■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

## 適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数					
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100~300ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内					
	はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類						1000~2000倍				
レタス	ナメクジ類	1000倍										
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000~2000倍										
だいこん	ナメクジ類 べと病	1000倍										
	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ ダイコンハムシ 白さび病 ワッカ症	2000倍										
かぶ	キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類							収穫7日前まで			1回	
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000~2000倍						収穫前日まで	2回以内			
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000倍										
にがうり らっきょう	アザミウマ類											
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000倍										
	コナジラミ類 うどんこ病	1000倍										
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍										
やまのいも	アブラムシ類 ナガイモコガ 葉波病											
ねぎ	アザミウマ類 アブラムシ類 ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ さび病 べと病	1000倍		収穫7日前まで								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ	アザミウマ類	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
	べと病 ネギハモグリバエ	1000倍		収穫7日前まで				
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000～2000倍		収穫前日まで	1回		1回	
ピーマン	アザミウマ類 チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	1000倍		収穫7日前まで				2回以内
にんにく	ネギコガ チューリップサビダニ アザミウマ類 アブラムシ類 さび病			収穫14日前まで				
にら	ネギアザミウマ			200～400ℓ /10a	摘採14日前まで		1回	1回
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500倍		100～300ℓ /10a	発生初期		4回以内	4回以内
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍						
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍		100～700ℓ/10a	発生初期		4回以内	4回以内
	白さび病				発生初期			
しきみ	アザミウマ類							

製品写真



最新の登録内容はこちら

