

ブイゲット粒剤

[チアジニル粒剤]

農林水産省登録 第21049号

有効成分 チアジニル…6.0%

性 状 類白色細粒

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
RACコード：殺菌[P3]

危険物：- 有効年限：4年 包装：3kg×6

特長

- 稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性（病害防除機能の増強）を有しており、耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。また、白葉枯病にも有効である。
- 葉いもちに対する防除効果が高く、安定した効果が長期間持続する。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 散布に当っては、田水深を3～5cm以上にし、均一に散布する。散布後少なくとも3～5日間は湛水状態を保ち、田面を露出させない。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
- 葉いもちに対して処理時期が遅れた場合、効果が劣ることがあるので、発生予察情報に注意し適期を失しないよう散布時期に注意し、予防的に散布する。
- 穂いもちが多発することが予想される場合には他の穂いもち剤との組み合わせで使用する。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） 白葉枯病	3kg/10a	葉いもちの初発20～7日前 (収穫45日前まで)	2回以内	湛水散布	3回以内 (直播では種時又は移植時までの 処理は1回以内、本田での散布は2回 以内)

製品写真



最新の登録内容はこちら

