

日農ダイアジノン乳剤40

[ダイアジノン乳剤]

農林水産省登録 第23885号

有効成分 ダイアジノン…40.0%

性状 淡黄色澄明可乳化油状液体

安全性：劇物 危険物：4-2石-III 有効年限：4年 包装：500mℓ×20 RACコード：殺虫[1B]

特長

- 広範囲の害虫に有効である。
- 野菜のアオムシ、アブラムシ類などにも優れた効果がある。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- 石灰硫黄合剤との混用はさける。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - 1)ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 2)受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 3)関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 芝の害虫防除に使用する場合、コガネムシ類幼虫には散布液が土壌中に十分しみこむように散布し、シバツトガ、スジキリヨトウには芝表面、地際にまきむらのないように散布する。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意する。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲みこんだ場合には、吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤がある。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布等作業の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入る。
- 公園等で使用する場合、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類、ドジョウ、ボラ）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避ける。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農業の総使用回数	
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類	1000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫30日前 まで	2回 以内	散布	2回以内	
	キスジノミハムシ	1200倍						
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ コナガ アブラムシ類	1000倍					2回以内 (粒剤の生育期の処 理は1回以内)	
	キスジノミハムシ	1200倍						
	キボシマルトビムシ	700倍						
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍					2回以内 (は種時及 びは種前の土壌混和 は合計1回以内)	
ねぎ わけぎ	アブラムシ類 ネギコガ			700～ 1200倍				2回 以内
	アザミウマ類	1000～ 2000倍						
	ネギハモグリバエ						700倍	
	タマネギバエ							
あさつき	アブラムシ類 ネギコガ			1000倍			2回以内	
	アザミウマ類	700～ 1200倍						
	ネギハモグリバエ		1000～ 2000倍					
	タマネギバエ							
たまねぎ	アブラムシ類		1000倍	2回以内				
	アザミウマ類	700～ 1200倍						
	ネギハモグリバエ				1000～ 2000倍			
	タマネギバエ							
なす (露地栽培)	アブラムシ類 テントウムシダマシ		1000倍	3回以内 (粒剤の生育期の処 理は2回以内)				
	ハダニ類	1000～ 2000倍						
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ		1000倍	3回以内 (植付前の土壌混和 は1回以内)				
さやいんげん	アブラムシ類	1000～ 2000倍			3回以内 (種子粉衣は1回以 内、粒剤は2回以 内)			
	ハダニ類							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類	1000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫開始 14日前まで	3回 以内	散布	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内、 乳剤は3回以内)
	ハダニ類	1000～ 2000倍					
すいか メロン	アブラムシ類	1000倍		収穫14日前 まで	4回 以内		4回以内 (粒剤の生育期の処 理は3回以内)
	ハダニ類	1000～ 2000倍					
	キボシマルトビムシ	700倍					
きゅうり	アブラムシ類	1000倍		植付時	1回		2回以内
	ハダニ類	1000～ 2000倍					
芝	コガネムシ類幼虫	800倍		3ℓ/m ²	発生初期		4回 以内
	シバツトガ スジキリヨトウ	1000倍	0.3～1ℓ /m ²				
	シバオサゾウムシ		0.3～0.5ℓ /m ²				

製品写真



最新の登録内容はこちら

