

ブイゲットフロアブル

[チアジニル水和剤]

農林水産省登録 第21298号

有効成分 チアジニル…30.0%

性状 淡褐色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：
500ml×20 RACコード：殺菌[P3]

特長

- 稲をいもち病にかかり難くする作用性（病害防除機能の増強）を有しており、耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。
- フロアブル製剤をペースト肥料に混和して側条施肥田植機施用でき省力的である。
- 側条施用により、ブイゲットの箱処理剤や本田水面施用剤と同等の効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 本剤をペースト肥料と混合して側条施用する場合は次の事項に注意する。
 - 1)本剤をペースト肥料に加えて均一に混合し、側条施肥田植機で本田に施用する。
 - 2)使用量に合わせ秤量し、使い切る。また、本剤と混合したペースト肥料は、速やかに使用する。
 - 3)同一の病害を防除対象とする育苗箱施用薬剤とは併用しない。
 - 4)本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、代かきは丁寧にいき、移植後は湛水状態（水深3～5cm）を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないように水管理に注意する。
 - 5)軟弱徒長苗、ムレ苗又は苗の生育が不良な場合には、薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 本剤を稲(育苗箱)に使用する場合は次の事項に注意する。
 - 1)育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注する。
 - 2)軟弱徒長苗、ムレ苗又は苗の生育が不良な場合は、薬害を生じるおそれがあるので注意する。
 - 3)きく等の他作物に影響を及ぼすおそれがあるので、その他の作物の栽培予定がある場所では使用しない。
- 砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チアジニルを含む農薬の総使用回数 |
|------------|----------------|--------|---|----------------|---------|---------------------------------|---|
| 稲 (箱育苗) | いもち病 | 25～50倍 | 育苗箱 (30×60×3cm、使用 土壌約5ℓ) 1箱当り500ml | 移植3日前～ 移植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内（移植時までの処理 は1回以内、本田での散布は2 回以内） |
| | 白葉枯病 もみ枯細菌病 | 50倍 | | | | | |
| 稲 | いもち病 | 原液 | 400～500ml/10a | 移植時 | | ペースト肥料に混合 し側条施肥田植機で 施用する。 | 3回以内（直播では種時又 は移植時までの処理は1回以 内、本田での散布は2回以 内） |

製品写真



最新の登録内容はこちら

