

ベフトップジンフロアブル

[イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤]

農林水産省登録 第21860号

有効成分 イミノクタジン酢酸塩…15.7%
チオファネートメチル…26.2%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：劇物 危険物：- 有効年限：4年 包装：500ml×20 RACコード：殺菌[M7][1]

特長

- 幅広い殺菌スペクトラムにより、みかんかんきつの貯蔵病害（緑かび病青かび病軸腐病等）に優れた防除効果を発揮する。
- 浸透性が高いトップジンに加えて、保護殺菌効果が強いイミノクタジン酢酸塩が含まれているため、効果が長期間持続する。
- 耐性菌出現リスクの低いイミノクタジン酢酸塩が含まれているため、ベンズイミダゾール系薬剤の耐性菌マネジメントに有効である。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用に際しては、容器をよく振る。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用する。
- ボルドー液とは沈殿を生じるので混用しない。塩化銅等の無機銅剤との混用はさける。
- 日本なし、もも、うめ等の果樹、稲、きゅうり、あぶらな科作物、まめ類には、葉に薬害を生じることがあるのでかからないように注意して散布する。
- かんきつの施設栽培で果実の着色終了前に使用する場合、果実に着色むらを生じるおそれがあるので、降雨時等の極端な多湿条件下での散布はさける。
- 蚕に対して毒性があるので桑にはかからないように注意して散布する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守る。
 - 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施する。
 - 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- 本剤を希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を用いて均一に散布する。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	
麦類 (小麦を除く)	赤かび病	1000倍	60~180ℓ/10a	収穫 14日前 まで	2回以内 (出穂期 以降は1回 以内)	散布	3回以内 (種子への 処理は1回以 内、散布は2 回以内、出 穂期以降は1 回以内)	3回以内 (種子への 処理は1回以 内、出穂期 以降は1回以 内)	
小麦	赤かび病 うどんこ病 葉枯症 赤さび病	800~ 1000倍		根雪前	3回以内 (出穂期 以降は1回 以内)		無人航空機に よる散布	4回以内 (種子への 処理は1回以 内、散布及 び無人航空 機散布は合 計3回以内、 出穂期以降 は1回以内)	4回以内 (種子への 処理は1回以 内、散布及 び無人航空 機散布は合 計3回以内、 出穂期以降 は2回以内)
	赤かび病	250倍	25ℓ/10a						
	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病	750~ 1000倍	60~180ℓ/10a	収穫 14日前 まで					
みかん	貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病) 貯蔵病害 (軸腐病) 貯蔵病害 (こうじかび病)	1500倍	200~700ℓ /10a	収穫 7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は3回 以内、散 布、空中散 布及び無人 航空機散布 は合計5回以 内)	
		25倍	8ℓ/10a			無人航空機に よる散布			
かんきつ (みかんを 除く)	貯蔵病害 (黒腐病) 貯蔵病害 (炭疽病) 貯蔵病害 (白かび病) 貯蔵病害 (すす斑病) 貯蔵病害 (黒斑病)	1500倍	200~700ℓ /10a	収穫 前日 まで	2回以内	散布	2回以内	8回以内 (塗布は3回 以内、散 布及び無人 航空機散布は 合計5回以 内)	

製品写真



最新の登録内容はこちら

