

スラゴ

[燐酸第二鉄粒剤]

農林水産省登録 第21929号

有効成分 燐酸第二鉄水和物…0.98%(鉄として0.28%)

性状 淡緑色粒状

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：1kg×12、2kg×8、450g×20、100g×60 RACコード：殺虫[-]

特長

- ナメクジカタツムリ類に対して特異的に食毒効果を発揮する。
- 雨、湿気に強い製剤で、湿った場所でも効果を発揮する。
- ナメクジカタツムリの被害がある全ての農作物に使用可能であり、日本農林規格（JAS）の有機農産物栽培においても使用することができる。

効果、薬害等に関する注意事項

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 作物体上に本剤がかからないように作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理する。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

水産動植物に対する注意事項

- この登録に係る方法では該当がない。

適用内容

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	磷酸第二鉄を含む農薬の総使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等	温室 ハウス 圃場 花壇	ナメクジ類 カタツムリ類	1~5g/m ²	発生時	-	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置	-
		アフリカマイマイ	3~5g/m ²				
		ヒメリンゴマイマイ	5g/m ²				

製品写真



最新の登録内容はこちら

