

# 日農ビームアプロードス タークル粉剤5DL

[ジノテフラン・ブプロフェジン・トリシクラゾール粉剤]

|         |  |
|---------|--|
| 農林水産省登録 | 第22063号  |
| 有効成分    | ジノテフラン…0.35%<br>ブプロフェジン…1.0%<br>トリシクラゾール…0.50% |
| 性状      | 類白色粉末 45μm以下 浮遊性<br>指数20以下                     |

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8  
RACコード：殺虫[4A][16]殺菌[16.1]

## 特長

- ウンカ類に定評のアプロード、カメムシ類に優れた効果を示すスタークルおよびいもち病に安定した効防除果を示すビームを配合した混合剤である。
- いもち病、ウンカ類およびカメムシ類を同時防除できる。
- 米の品質低下に繋がる斑点米カメムシ類に対しても安定した防除効果を発揮する。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 野菜類の幼苗及びなし（二十世紀、幸水、新水等）には、薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布の際は農業用マスクなどを着用する。作業後はうがいをする。

適用内容

| 作物名 | 適用病害虫名                            | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数  | ブプロフェジンを含む農薬の総使用回数   | トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数             |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------|---------|------|--|----------------------|---------------------------------|
| 稲   | ウンカ類<br>カメムシ類<br>ツマグロヨコバイ<br>いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内    | 散布   | 4回以内<br>(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内) | 4回以内<br>(小包装投入は1回以内) | 4回以内<br>(育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内) |

製品写真



最新の登録内容はこちら

