

日農モンカットベフラン フロアブル

[イミノクタジン酢酸塩・フルトラニル水和剤]

農林水産省登録 第22265号

有効成分 イミノクタジン酢酸塩…10.0%
フルトラニル…20.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：劇物 危険物：- 有効年限：4年 包装：2ℓ×6 RACコード：殺菌[M7][7]

特長

- モンカットとベフランの複合剤であり、小麦の紅色雪腐病と雪腐小粒菌核病を同時に防除できる。
- モンカットは雪腐小粒菌核病（黒色小粒菌核病褐色小粒菌核病）に対し高い効果を示し、ベフランは紅色雪腐病に対し高い保護殺菌効果を示す。
- 無人ヘリコプターでの散布にも使用できる。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用に際しては、容器をよく振る。
- 希釈倍数125倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を用いて均一に散布する。
- 無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守る。
 - 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
 - 散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布薬液の飛散によって自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 散布終了後は次の事項を守る。
 - 使用後の空容器は放置せず安全な場所に廃棄する。
 - 機体の散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- イミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

- 皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	500倍	60～150ℓ/10a	根雪前	2回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、 散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、 出穂期以降は1回以内)	2回以内
	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	125倍	25ℓ/10a					
		4倍	800mℓ/10a			無人ヘリコプターによる散布		

製品写真



最新の登録内容はこちら

