

アクセルフロアブル

[メタフルミゾン水和剤]

農林水産省登録 第22461号

有効成分 メタフルミゾン…25.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
×20 RACコード：殺虫[22B]

危険物：- 有効年限：5年 包装：500ml

特長

- ・ チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮する。
- ・ 齢期の進んだチョウ目害虫の幼虫にも高い効果を発揮する。
- ・ 他薬剤とのローテーション散布に有効である。

効果、薬害等に関する注意事項

- ・ 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ・ 使用前に容器を軽く振る。
- ・ 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節する。
- ・ 本剤は植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- ・ 本剤をクビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意する。
 - 1) 樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入する。
 - 2) 散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布する。
- ・ うめに全面土壌散布する場合は、過度な降雨等により土壌に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさける。
- ・ すももに樹幹散布で使用する場合は、散布液が果実にかかると汚れを生じるおそれがあるので果実にかからないように十分注意する。
- ・ みずかけな（水掛菜）、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用后14日間は入水しない。
- ・ ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - 1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しない。
 - 2) 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- ・ 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ・ 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守る。
 - 1) 散布は散布機種の散布基準に従って実施する。
 - 2) 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 4) 散布薬液の飛散によって自動車やカートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 5) 散布終了後は次の項目を守る。

(a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。

(b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。

- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼うがいをする。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも使用当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	主幹から株元に散布	3回以内	
		1000~4000倍	200~700ℓ/10a			散布		
	アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ	1000~2000倍				無人航空機による散布		
		ゴマダラカミキリ				12倍		4~8ℓ/10a
		アゲハ類				15倍		8~10ℓ/10a
	ヨモギエダシャク	24倍	10~16ℓ/10a					
キウイフルーツ	ケムシ類			収穫前日まで	2回以内	4回以内 (樹幹散布は2回以内、 散布は2回以内)		
もも類 すもも	クビアカツヤカミキリ ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a				散布	
	クビアカツヤカミキリ	100~200倍	5~200ℓ/10a				樹幹散布	
うめ	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ	1000倍	200~700ℓ/10a				散布	
	ケシクスイ類	1000~2000倍 1000倍					全面土壌散布	
とうもろこし	アワノメイガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a				3回以内	散布
	ツマジロクサヨトウ	1000倍						
飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ	1000~2000倍						
	ツマジロクサヨトウ	1000倍						
アスパラガス	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~800ℓ/10a					
ごぼう	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍	100~300ℓ/10a					
トマト ミニトマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000~2000倍						
	トマトキバガ	1000倍						
ピーマン	オオタバコガ	1000~2000倍						
なす	オオタバコガ ニジユウヤホシテントウ ハスモンヨトウ							
	ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類			1000倍				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000倍	100~300ℓ/10a				
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ	1000~2000倍			散布		
	ウリハムシモドキ	1000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウバ類	8倍			1.6ℓ/10a	無人航空機による散布	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000倍	100~300ℓ/10a		散布		
ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウバ類	1000~2000倍						
はくさい	コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	8倍	1.6ℓ/10a		無人航空機による散布	3回以内	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000倍	100~300ℓ/10a				散布
ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	1000~2000倍						
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	8倍	1.6ℓ/10a	無人航空機による散布			
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000~2000倍	100~300ℓ/10a			散布	
非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	8倍	1.6ℓ/10a	2回以内	無人航空機による散布	2回以内	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000~2000倍	100~300ℓ/10a				散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数			
カリフラワー	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内			
ブロッコリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ	8倍	1.6ℓ/10a							
		10倍	2ℓ/10a							
		16倍	3.2ℓ/10a							
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ キスジノミハムシ	1000倍	100~300ℓ /10a		3回以内	散布		3回以内		
	ハスモンヨトウ	2000倍								
だいこん	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000倍			1000~2000倍			2回以内	2回以内	
	ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ類	1000~2000倍								
かぶ	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000倍			収穫3日前まで			3回以内	無人航空機による散布	3回以内
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ	1000~2000倍			収穫前日まで					
	フタスジヒメハムシ	1000倍								
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	1000~2000倍		3.2ℓ/10a						
		16倍								
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ	10~16倍		0.8~1.6ℓ/10a						
さといも	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300ℓ /10a	発生初期	散布	6回以内				
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍								
きく	オオタバコガ シロイチモジヨトウ	1000~2000倍								
花き類・観葉植物 (きくを除く)	オオタバコガ	1000倍	200~700ℓ /10a	成虫発生直前~成虫発生期	主幹から 株元に散布	6回以内				
樹木類 (さくらを除く)	ケムシ類	1000~4000倍								
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍					5~200ℓ/10a			
		200倍								
		100倍	—	—	木屑排出孔を 中心に薬液が 滴るまで樹幹 注入					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
たばこ	ヨトウムシ	1000~2000倍	25~180ℓ /10a	収穫10日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍					

製品写真



最新の登録内容はこちら

