アクセルフロアブル

[メタフルミゾン水和剤]

農林水産省登録 第22461号
有効成分 メタフルミゾン…25.0%
性　　状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）　危険物：-　有効年限：4年　包装：500㎖×20　RACコード：殺虫[22B]

特長

- チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮する。
- 齢期の進んだチョウ目害虫の幼虫にも高い効果を発揮する。
- 他薬剤とのローテーション散布に有効である。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前に容器を軽く振る。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節する。
- 本剤は植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- 本剤をクビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意する。
  1)樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入する。
  2)散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布する。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しない。
  2) 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- みずかけな（水掛菜）、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用後14日間は入水しない。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守る。
  1)散布は散布機種の散布基準に従って実施する。
  2)散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用する。
  3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
  4)散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意する。
  5)散布終了後は次の項目を守る。
    (a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。
    (b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼うがいをする。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも使用当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

適用内容

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="3">かんきつ</td><td rowspan="2">ゴマダラカミキリ</td><td>200倍</td><td>5～200ℓ/10a</td><td rowspan="3">収穫7日前まで</td><td rowspan="14">3回以内</td><td>主幹から株元に散布</td><td rowspan="14">3回以内</td></tr>
<tr><td>1000～4000倍</td><td rowspan="5">200～700ℓ/10a</td><td rowspan="13">散布</td></tr>
<tr><td>アゲハ類
ヨモギエダシャク
クワノミハムシ
ミカンナガタマムシ</td><td>1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>キウイフルーツ</td><td>ケムシ類</td><td rowspan="3">1000倍</td><td rowspan="11">収穫前日まで</td></tr>
<tr><td rowspan="2">うめ</td><td>ケムシ類
クビアカツヤカミキリ</td></tr>
<tr><td>ケシキスイ類</td><td rowspan="2">1000～2000倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">とうもろこし</td><td>アワノメイガ</td><td rowspan="4">100～300ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>ツマジロクサヨトウ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">飼料用とうもろこし（子実）</td><td>アワノメイガ</td><td>1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>ツマジロクサヨトウ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td>アスパラガス</td><td rowspan="2">ハスモンヨトウ</td><td rowspan="2">1000～2000倍</td><td>100～800ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>ごぼう</td><td>ヒョウタンゾウムシ類</td><td>1000倍</td><td rowspan="6">100～300ℓ/10a</td></tr>
<tr><td rowspan="2">トマト
ミニトマト</td><td>オオタバコガ
ハスモンヨトウ</td><td>1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>トマトキバガ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td>ピーマン</td><td>オオタバコガ</td><td rowspan="2">1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>なす</td><td>オオタバコガ
ニジュウヤホシテントウ
ハスモンヨトウ</td></tr>
<tr><td>にんじん</td><td>ハスモンヨトウ
ヒョウタンゾウムシ類</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ねぎ</td><td rowspan="4">シロイチモジヨトウ</td><td>8倍</td><td>1.6ℓ/10a</td><td rowspan="3">2回以内</td><td rowspan="3">無人航空機による散布</td><td rowspan="3">2回以内</td></tr>
<tr><td>10倍</td><td>2ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>16倍</td><td>3.2ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>1000倍</td><td rowspan="3">100～300ℓ/10a</td><td rowspan="3">散布</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ほうれんそう</td><td>ハスモンヨトウ
シロオビノメイガ</td><td>1000～2000倍</td><td>3回以内</td><td>3回以内</td></tr>
<tr><td>ウリハムシモドキ</td><td>1000倍</td></tr>
</table>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類	8倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a			散布	
	ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類	1000～2000倍					
はくさい	コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	8倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a			散布	
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類	1000～2000倍					
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	8倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000～2000倍	100～300ℓ/10a			散布	
非結球レタス		8倍	1.6ℓ/10a		2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000～2000倍	100～300ℓ/10a			散布	
カリフラワー	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000倍					
ブロッコリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ	8倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ	1000倍	100～300ℓ/10a			散布	
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～2000倍					

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">非結球あぶらな科葉菜類</td><td>コナガ
キスジノミハムシ</td><td>1000倍</td><td rowspan="9">100～300ℓ/10a</td><td rowspan="2">収穫前日まで</td><td rowspan="2">3回以内</td><td rowspan="9">散布</td><td rowspan="2">3回以内</td></tr>
<tr><td>ハスモンヨトウ</td><td>2000倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">だいこん</td><td>キスジノミハムシ
ダイコンハムシ</td><td>1000倍</td><td rowspan="2">収穫7日前まで</td><td rowspan="3">2回以内</td><td rowspan="3">2回以内</td></tr>
<tr><td>ハイマダラノメイガ
ヨトウムシ
カブラハバチ類</td><td>1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>かぶ</td><td>コナガ
アオムシ
キスジノミハムシ</td><td>1000倍</td><td>収穫3日前まで</td></tr>
<tr><td rowspan="2">えだまめ
だいず</td><td>ハスモンヨトウ</td><td>1000～2000倍</td><td rowspan="6">収穫前日まで</td><td rowspan="6">3回以内</td><td rowspan="6">3回以内</td></tr>
<tr><td>フタスジヒメハムシ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">しょうが</td><td rowspan="2">ハスモンヨトウ
アワノメイガ</td><td>1000～2000倍</td></tr>
<tr><td>16倍</td><td>3.2ℓ/10a</td><td>無人航空機による散布</td></tr>
<tr><td rowspan="2">かんしょ</td><td rowspan="2">ハスモンヨトウ
ナカジロシタバ
ヨツモンカメノコハムシ</td><td>10～16倍</td><td>0.8～1.6ℓ/10a</td><td rowspan="6">散布</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1000～2000倍</td><td rowspan="5">100～300ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>さといも</td><td>ハスモンヨトウ</td></tr>
<tr><td>食用ミニバラ</td><td>オオタバコガ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td>きく</td><td>オオタバコガ
シロイチモジヨトウ</td><td>1000～2000倍</td><td rowspan="3">発生初期</td><td rowspan="7">6回以内</td><td rowspan="7">6回以内</td></tr>
<tr><td>花き類・観葉植物
（きくを除く）</td><td>オオタバコガ</td><td>1000倍</td></tr>
<tr><td>樹木類
（さくらを除く）</td><td rowspan="2">ケムシ類</td><td>1000～4000倍</td><td rowspan="2">200～700ℓ/10a</td></tr>
<tr><td rowspan="4">さくら</td><td rowspan="3">クビアカツヤカミキリ</td><td>1000倍</td><td rowspan="2">成虫発生直前～成虫発生期</td></tr>
<tr><td>200倍</td><td>5～200ℓ/10a</td><td>主幹から株元に散布</td></tr>
<tr><td>100倍</td><td>—</td><td>—</td><td>木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入</td></tr>
<tr><td rowspan="2">たばこ</td><td>ヨトウムシ</td><td>1000～2000倍</td><td rowspan="2">25～180ℓ/10a</td><td rowspan="2">収穫10日前まで</td><td rowspan="2">2回以内</td><td rowspan="2">散布</td><td rowspan="2">2回以内</td></tr>
<tr><td>タバコアオムシ</td><td>2000倍</td></tr>
</table>

製品写真

最新の登録内容はこちら