

アクセルキングフロアブル

[トルフェンピラド・メタフルミゾン水和剤]

農林水産省登録 第22565号
有効成分 トルフェンピラド…12.0%
メタフルミゾン…19.0%
性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：劇物 危険物：- 有効年限：4年 包装：500ml×20 RACコード：殺虫[21A][22B]

特長

- コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、アブラムシ類などの幅広い害虫に優れた効果を発揮する。
- 既存剤に対する感受性の低下した害虫にも優れた効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- 本剤は植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- レタス及びはくさいの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 周辺作物（なす、トマト、きゅうり、かぶの幼苗期およびこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜）にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう十分注意して散布する。
- カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用后14日間は入水しない。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 天敵昆虫に対して影響があるので注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ゴマダラカミキリ チャノキイロアザミウマ	2000倍	200～ 700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内	
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類 ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ネギアザミウマ	1000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日前まで					
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ナモグリバエ ネギアザミウマ								
レタス	オオタバコガ アブラムシ類 ナモグリバエ ハスモンヨトウ	1000～ 1500倍							
	ヨトウムシ ウワバ類	1500倍							
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ ネギアザミウマ	1000倍		収穫7日前まで					2回以内
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 オオタバコガ アザミウマ類			発生初期					4回以内
きく	アブラムシ類 オオタバコガ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類								

製品写真



最新の登録内容はこちら

