

日農ポリオキシシンAL乳剤

[ポリオキシシン乳剤]

農林水産省登録	第12026号
有効成分	ポリオキシシン複合体…10.0% (ポリオキシシンBとして 100000AmBu/g)
性状	淡黄色透明液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：
500ml×20 RACコード：殺菌[19]

特長

- 有効成分は天然物由来であり、糸状菌病害に有効な抗生物質剤である。
- 野菜のうどんこ病に優れた防除効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液等のアルカリ性薬剤との混用はさける。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組合わせて輪番で使用する。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋などをして散布液を吸い込んだり、多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをする。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
トマト	葉かび病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	うどんこ病			収穫開始14日前まで	2回以内		2回以内
いちご				収穫前日まで	3回以内		3回以内
なす				収穫前日まで	3回以内		3回以内
ピーマン		収穫開始14日前まで		5回以内	5回以内		
ばら きく		500～1000倍		発病初期	8回以内		8回以内
カーネーション				斑点病			

製品写真



最新の登録内容はこちら

