

マイリノー

[展着剤]

農林水産省登録 第12844号

有効成分 ポリアルキレングリコールアル
キルエーテル…27.0%

性 状 微黄色の粘稠な液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
500ml×20、5l×4

危険物：4-2石-III 有効年限：5年 包装：

特長

- 低起泡性の展着剤であり、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用があります。泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。
- 水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。
- 薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 所定量の本剤を直接、散布液に加えるか、又は予め少量の水で薄めてから薬液に加え、十分かきまぜてから散布する。
- 使用前に容器を軽く振る。
- 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので散布液がかからないよう注意する。
- 薬液のつきにくい作物には多目に、つきやすい作物には少な目に使用する。
- 本剤の使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当をうける。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

| 適用農薬名 | 作物名 | 使用量 | 使用方法 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|
| 抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤 有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤 | 稲、麦、キャベツ、ねぎ等の 薬液のつきにくい作物 | 1~2mℓ/散布液10ℓ | 添加 |
| | 果樹、野菜等で薬液 のつきやすい作物 | 0.5~1mℓ/散布液10ℓ | |
| 摘果剤(NAC水和剤) | りんご | 0.5~2mℓ/散布液10ℓ | |

製品写真



最新の登録内容はこちら

