

# 日農デナポン5%バイト

[NAC粒剤]

農林水産省登録 第12885号

有効成分 NAC...5.0%

性 状 淡褐色粒状 4~7mm

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

危険物：-

有効年限：4年

包装：2kg×8

RACコード：殺虫[1A]

## 特長

- デナポン（NAC）に強い誘引物質が配剤されているためネキリムシ類、ダンゴムシなど害虫が引き寄せられ、好んで食べ殺虫する。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- たばこの芯葉に付着すると薬害を生ずるので、かからないように注意して使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。

## 安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤による中毒の治療法としては硫酸アトロピン製剤の投与が有効である。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしない。

## 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	NACを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg/10a				
はくさい	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫21日前まで			
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg/10a				
だいこん	ネキリムシ類	3~6kg/10a	収穫30日前まで	4回以内	4回以内	
たばこ			移植時	1回	2回以内	

製品写真



最新の登録内容はこちら

