

日農スミチオン粉剤3DL

[MEP粉剤]

農林水産省登録 第15410号

有効成分 MEP...3.0%

性状 類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

危険物：-

有効年限：4年

包装：3kg×8

RACコード：殺虫[1B]

特長

- 殺虫スペクトルが広く広範囲の害虫に安定した効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤はあぶらな科作物には薬害を生ずることがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

安全使用上の注意事項

- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用する。作業後はうがいをする。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農業の総使用回数
稲	—	ニカメイチュウ ウンカ類 コブノメイガ カメムシ類 イネドロオイムシ アザミウマ類	3~4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内 (但し、 出穂前は1 回)	散布	3回以内 (種もみ への処理は1回以 内、育苗箱散布 は1回以内、本田 では2回以内)
		アワヨトウ	4kg/10a				
さとうきび	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソウ 等の多年生雑草が優占 している休耕田	カンシャコバネナガカメムシ	3~4kg/10a	収穫45日前まで	4回以内		4回以内
水田作物、 畑作物 (休耕田)		カメムシ類		—			
だいず	—	—	4kg/10a	収穫21日前まで	—	—	

製品写真



最新の登録内容はこちら

