

アクセルベイト

[メタフルミゾン粒剤]

農林水産省登録 第22875号

有効成分 メタフルミゾン…0.20%

性状 淡褐色粒状 径3mm、長さ2～10mm

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
RACコード：殺虫[22B]

危険物：- 有効年限：5年 包装：2kg×8

特長

- 害虫を誘引し、有効成分を摂食させて殺虫するベイト剤である。作物の株元にまくだけで、簡単にネキリムシ類やハスモンヨトウ、コオロギ類を防除できる。
- メタフルミゾンは害虫への経口作用が強く、ベイト剤に適している。難防除のハスモンヨトウやネキリムシの老齢幼虫にも高い効果を発揮する。
- チョウ目害虫のネキリムシ類やハスモンヨトウ以外に、コオロギ類にも効果を示し、これらの害虫の同時防除ができる。
- 殺虫剤分類：22B

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および害虫の発生状況に合わせて調節する。
- 本剤が作物体にかからないよう株元の土壌表面に散布する。
- ハスモンヨトウの防除に使用する場合は、地表部に生息する幼虫に対し有効であるので時期を失ないように使用する。
- カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用后14日間は入水しない。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
キャベツ はくさい	ネキリムシ類 ハスモンヨトウ コオロギ類	3~6kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
だいこん	ネキリムシ類		収穫前日まで	2回以内		3回以内
ブロッコリー	ネキリムシ類 コオロギ類					
非結球レタス ねぎ	ネキリムシ類					
レタス しょうが ごぼう だいず えだまめ						
アスパラガス いちご	ハスモンヨトウ		3回以内			
にんじん	ネキリムシ類 ハスモンヨトウ	6kg/10a	生育期	6回以内		6回以内
	コオロギ類					
たまねぎ	ネキリムシ類	3~6kg/10a	3回以内	6回以内		
花き類・観葉植物	ネキリムシ類	3~6kg/10a	生育期	6回以内	6回以内	

製品写真



最新の登録内容はこちら

