

日農アグロスリン水和剤

[シペルメトリン水和剤]

農林水産省登録 第16585号

有効成分 シペルメトリン…6.0%

性状 淡褐色水和性粉末 45μm以下

安全性：劇物 危険物：- 有効年限：4年 包装：500g×20 RACコード：殺虫[3A]

特長

- 広い殺虫スペクトラムを有し、広範囲の害虫に効果を示す。
- 接触毒作用により強い殺虫力を示し、また速効的である。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- くりのクリタマバチには羽化脱出期、クリシギゾウムシには裂果前にそれぞれ使用する。
- 本剤の茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意する。
- みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用后14日間は入水しない。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - 1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 3) 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入る。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意する。
- 摘果等の作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用は避ける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数			
かんきつ	アケビコノハ ヒメエグリバ アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンバエ成虫	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
りんご	アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ シンクイムシ類	1000～ 2000倍		2回以内	収穫前日 まで		3回以内	3回以内		
	ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ ヒメシロモンドクガ	1000倍								
なし	ナンチビガ アブラゼミ	1000～ 2000倍		3回以内						
	シンクイムシ類 カメムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類									
もも	クビアカツヤカミキリ	1000倍		5回以内						
	モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ カメムシ類	1000～ 2000倍								
	カメムシ類 カキノヘタムシガ アザミウマ類	3回以内								
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類	1000～ 3000倍		5回以内					収穫21日前 まで	
	チャノキイロアザミウマ									
くり	クリタマバチ	1000倍		収穫7日前 まで						
	クリシギゾウムシ	1000～ 3000倍								
おうとう	カメムシ類 ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ クビアカツヤカミキリ	1000倍		収穫3日前 まで					2回以内	2回以内
うめ	アブラムシ類 モモチメヨコバイ	2000倍		収穫7日前 まで					3回以内	3回以内
すもも	シンクイムシ類 カメムシ類 クビアカツヤカミキリ	1000倍		収穫前日 まで					2回以内	2回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数															
ネクタリン	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内															
	シンクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	1000～2000倍			3回以内		3回以内															
くるみ	アメリカシロヒトリ		1000～2000倍	収穫7日前まで	5回以内		散布	5回以内														
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	1000倍							収穫前日まで	5回以内												
	アザミウマ類	1000倍																				
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内				散布	5回以内												
	アザミウマ類	1000倍																				
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	1回						散布	5回以内										
はつかだいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫3日前まで																		
なばな類	アブラムシ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内								散布	5回以内								
レタス		2000倍			5回以内																	
非結球レタス					2回以内																	
ピーマン	アブラムシ類 タバコガ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内										散布	5回以内						
きゅうり なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ																1000倍					
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内												散布	5回以内				
ミニトマト		2000倍																				
すいか メロン	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内														散布	5回以内		
たまねぎ	アザミウマ類																					
みょうが(花穂)	アブラムシ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内																散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	5回以内
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ																					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数		
みょうが(莖葉)	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで	5回以内	散布	5回以内		
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	1000倍							
ばれいしょ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫7日前まで	4回以内			4回以内	
てんさい	ヨトウムシ			収穫14日前まで					
かんしょ	アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ			1000倍	収穫7日前まで			5回以内	5回以内
	イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ハムシ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ								
かんしょ(莖葉)	アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ	1000～2000倍		2回以内	2回以内			2回以内	
	イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ハムシ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ	1000倍							
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ	1000倍		200～400ℓ /10a	摘採14日前まで			1回	1回
	ヨモギエダシャク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	1000～2000倍							
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700ℓ /10a	成虫発生初期	6回以内	6回以内			

製品写真



最新の登録内容はこちら

