

日農ヒエクリーンバサグ ラン粒剤

[ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤]

農林水産省登録 第23951号
有効成分 ピリミノバックメチル…0.40%
ベンタゾン…11.0%
性 状 淡灰色細粒

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8
RACコード：除草[2][6]

特長

- ノビエに長期残効性を示すピリミノバックメチルと広葉雑草に安定した効果を発揮するベンタゾンを配合した2成分の水稲用中後期除草剤です。
- 殺草スペクトルが広く、クログワイやオモダカ、シズイなどの難防除雑草に対しても有効です。
- 散布適期が長く、余裕をもって処理できます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 1) 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 2) 本剤はノビエの発生前から4葉期に有効であり、イネ科以外の雑草には生育期に有効であるので時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布する。ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ウリカワは4葉期まで、オモダカは矢尻葉抽出期まで、クログワイは草丈15cm前後、シズイは草丈30cmまでが本剤の散布適期である。
- 3) オモダカ、クログワイ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせる。
- 4) 苗の植付けが均一となるように、代かきおよび植付作業はていねいにおこなう。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいにおこなう。
- 5) 散布の際は、本剤は水の移動に伴う移行性が大きいので、水の出入りを止めてごく浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にして田面に均一に散布し、少なくとも2日間はそのままの状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。深水にすると効果が劣るので注意する。
- 6) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。万が一散布後に降雨があった場合は、落水させずそのままの状態を保つ。
- 7) 以下のような条件下では薬害の生じるおそれがあるので使用をさける。
 - 1)砂質土壌の水田、漏水田（減水深2cm／日以上）。
 - 2)軟弱苗を移植した水田。
 - 3)極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田。
- 8) 散布後の数日間に著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていない。
- 9) 本剤を散布した水田の田面水を他の作物に灌水しない。
- 10) 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしない。
- 11) 本剤はその殺草特性からくわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意する。
- 12) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

■ 安全使用上の注意事項

- 1) 誤食などのないよう注意する。
- 2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバツクメチルを含む農薬の総使用回数	ペンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ シズイ	移植後15日～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで	3kg/10a	1回	ごく浅く湛水して散布	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ	稲3葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで					

製品写真



最新の登録内容はこちら

