

日農バサグラン液剤（ナトリウム塩）

[ベンタゾン液剤]

農林水産省登録 第23964号
有効成分 ベンタゾン…40.0%
性状 赤色澄明水溶性液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
×20 RACコード：除草[6]

危険物：- 有効年限：5年 包装：500ml

特長

- 水田のイネ科を除く一年生雑草やホタルイ、オモダカ、クログワイなどの多年生雑草に高い効果を発揮する水稲用中後期除草剤です。
- 生育期の雑草に高い殺草効果を発揮するため、雑草の発生を見てから使用できます。

効果、薬害等に関する注意事項

- イネ科雑草には効果がないので、イネ科雑草の優占ほ場での使用はひかえる。また、イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用する。
- 本剤は一年生広葉雑草に有効であるが、作物ごとに使用量等が異なるので、時期を失ないように、雑草茎葉にかかると均一に散布する。

各作物の雑草への散布適期は以下のとおりである。

らっきょう、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類（小麦を除く）、小麦、はとむぎ、せり、おうぎ 雑草3～6葉期
べにばないんげん 雑草の生育初期～6葉期
たまねぎ 雑草の3～4葉期
いんげんまめ 雑草の2～3葉期

- 散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるので、晴天時を見はからって散布するのが望ましい。
- 高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさける。
- 重複散布は薬害のおそれがあるのでさける。また、周辺作物にかからないように注意する。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- いんげんまめ、せりに使用する場合、本剤は葉枯褐変症状の薬害を生じやすく、蒸散の盛んな高温乾燥条件下では薬害により減収することがあるので、雑草害が予想される場合に限り使用する。
- たまねぎに使用する場合、直播栽培および苗床のたまねぎには、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- べにばないんげんに使用する場合、薬液が作物に飛散すると葉に褐変症状の薬害を生じるので、作物に飛散しないように注意する。
- せりに使用する場合には、落水状態にして水の出入りをとめ、まきむらのないよう均一に散布する。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しない。
- おうぎに使用する場合、本剤は一時的には葉先の黄化等の薬害を生じることがあるので、特に天候等をよくみきわめてから散布する。
- 水稲に使用する場合には一般的注意事項のほか下記についてとくに注意する。

- 1)本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - イ) 使用にあたっては落水状態にして水の出入りをとめ、まきむらのないように均一に散布する。
 - ロ) 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないように均一に散布する。
 - ハ) 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しない。
- 二) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
- ホ) 深水にすると効果が劣るので注意する。
- 2)イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用する。
- 3)本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布する。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から増殖初期まで、クログワイでは草丈15～30cm、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cm、コウキヤガラでは増殖期、クサネムでは本葉展開期が本剤散布の適期である。
- 4)クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- 5)軟弱稲では薬害（接触害）のおそれがあるので使用はさける。
- 6)高温など薬害を生じやすい条件での使用は多めの希釈水量を用い、低濃度液をなるべく水稻にかからないように散布する。
- 7)砂質土および漏水のはげしい水田では使用しない。（減水深2cm／日以上）

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意する。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

日農バサグラン液剤 (ナトリウム塩)

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15日～収穫45日前まで	500～700mℓ /10a	70～100ℓ /10a	2回以内	落水散布 又は ごく浅く湛水 して散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35日～収穫45日前まで					
たまねぎ	一年生雑草 (イネ科を除く)	春播栽培の移植後6月上旬まで 但し 収穫30日前まで	60～120mℓ /10a				
らっきょう		秋播栽培の移植後生葉4葉期 まで 但し 収穫30日前まで	100～200mℓ /10a				
いんげんまめ		出芽後 但し 収穫60日前まで	50～70mℓ /10a				
えんどうまめ		初生葉展開期～本葉抽出始期	100～200mℓ /10a				
実えんどう さやえんどう		3～6葉期 但し 収穫70日前まで	100～200mℓ /10a				
とうもろこし		3～6葉期 但し 収穫40日前まで	100～150mℓ /10a				
飼料用とうもろ こし		生育期 但し 収穫50日前まで					
ソルガム		生育期 但し 収穫30日前まで	100～200mℓ /10a				
麦類(小麦を除 く)		生育期 但し 収穫90日前まで					
小麦		生育期 但し 収穫45日前まで	150mℓ/10a				
はとむぎ			2回以内				
べにばないんげ ん			100～200mℓ /10a				
せり		親株養成期 植付45～60日後まで	200mℓ/10a	100ℓ/10a	1回	畦間雑草茎葉 散布 雑草茎葉散布 又は全面散布	2回以内

日農バサグラン液剤（ナトリウム塩）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
おうぎ	一年生雑草 (イネ科を除く)	生育期 但し 収穫30日前まで	200mℓ/10a	100ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布	2回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

