

日農バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

[ベンタゾン粒剤]

農林水産省登録 第23963号
有効成分 ベンタゾン…11.0%
性状 類白色細粒

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8
RACコード：除草[6]

特長

- 水田のイネ科を除く一年生雑草やホタルイ、オモダカ、クログワイなどの多年生雑草に高い効果を発揮する水稲用中後期除草剤です。
- 生育期の雑草に高い殺草効果を発揮するため、雑草の発生を見てから使用できます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - イ) 使用にあたっては落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りをとめ、まきむらのないよう均一に散布する。
 - ロ) 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないよう均一に散布する。
 - ハ) 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しない。
 - ニ) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
 - ホ) 深水にすると効果が劣るので注意する。
- イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用する。
- 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しない。（減水深2cm／日以上）
- 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布する。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cmが本剤散布の適期である。
- クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 誤食などのないよう注意する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

日農バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	移植後15日～収穫45日前まで	3～4kg/10a	1回	落水散布 又は ごく浅く湛水して散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～収穫45日前まで	3kg/10a			

製品写真



最新の登録内容はこちら

