

日農アグロスリン乳剤

[シペルメトリン乳剤]

農林水産省登録 第16591号

有効成分 シペルメトリン…6.0%

性状 淡黄色澄明可乳化油状液体

安全性：劇物 危険物：4-2石-III 有効年限：4年 包装：500mℓ×20 RACコード：殺虫[3A]

特長

- 広い殺虫スペクトラムを有し、広範囲の害虫に効果を示す。
- 接触毒作用により強い殺虫力を示し、また速効的である。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- ねぎのシロイチモジヨトウに散布する場合は、食入前の若令幼虫期に散布する。
- 本剤のかんきつでの散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合には次の注意を守る。
 - 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施する。
 - 散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しない。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤で処理したえんばくの種子は食用及び飼料用には用いない。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には、直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。

- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用する。また、散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- のど、鼻、皮膚などを刺激する場合、またかゆみを生じる場合があるので注意する。
- 摘果等の作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ アブラムシ類 コアオハナムグリ ケシクスイ類 カメムシ類	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
キウイフルーツ	キイロマイコガ キクビスカシバ キウイヒメヨコバイ カメムシ類							
麦類	アブラムシ類	2000倍	60～ 150ℓ /10a	収穫21日前 まで				
とうもろこし	アワノメイガ アブラムシ類	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで				
	アワヨトウ	1000倍						
だいず	マメシクイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ジャガイモヒゲナガアブラムシ	2000倍						
えだまめ	マメシクイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ							
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類							
らっかせい 未成熟ささげ	アブラムシ類							収穫前日 まで
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ							収穫7日前 まで
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				1000倍			
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ							
すいか	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1000～2000 倍			収穫前日 まで	5回以内	5回以内	
メロン	アブラムシ類	2000倍						
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000倍						
かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000倍						
べばかぼちゃ(種子)	ヨトウムシ		収穫7日前 まで	4回以内	4回以内			
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ		収穫前日 まで	5回以内	5回以内			
なす	ミナミキイロアザミウマ	1000倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数				
ピーマン いちご	アブラムシ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内				
アスパラガス	ヨトウムシ		100～ 500ℓ /10a		3回以内		3回以内				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで	5回以内		5回以内				
	アブラムシ類 ネギコガ ネギハモグリバエ アザミウマ類	2000倍		収穫3日前 まで	2回以内		2回以内				
わけぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍									
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	2000倍		2.4ℓ/10a	収穫7日前 まで		5回以内	無人航空 機による 散布	5回以内		
	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	48倍									
にんじん	ヨトウムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内		散布	2回以内			
にら	ネギアザミウマ ヨトウムシ類 ネギコガ				3回以内			3回以内			
にら(花茎)	ハモグリバエ類 クロバネキノコバエ類				3回以内			3回以内			
ごぼう	アブラムシ類 ヒョウタンゾウムシ類				5回以内	5回以内					
ほうれんそう	ヨトウムシ アブラムシ類				1000倍	収穫7日前 まで		5回以内	5回以内		
	ミナミキイロアザミウマ										
チンゲンサイ	アオムシ アブラムシ類				2000倍	100～ 300ℓ /10a		収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)	アブラムシ類								5回以内		5回以内
レタス									2回以内		2回以内
非結球レタス											
葉にんにく	ネギアザミウマ	3回以内	3回以内								
らっきょう		5回以内	5回以内								
エンサイ	ハスモンヨトウ	2回以内	2回以内								
えごま (種子)	ウリハムシモドキ	2回以内	2回以内								
しそ科葉菜類 (しそ、バジルを除く)	アブラムシ類	1回	1回								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数		
しそ	ヒシモンヨコバイ アブラムシ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで	1回	散布	1回		
しそ(花穂) バジル	アブラムシ類				2回以内		2回以内		
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1500倍		収穫3日前 まで	1回		1回		
食用プリムラ 食用金魚草 食用エキザカム 食用カーネーション 食用せんいちこう 食用トレニア 食用なでしこ 食用パンジー	アブラムシ類			収穫14日前 まで	2回以内		2回以内		
飼料用えんぱく (は種 用種子)	コクヌストモドキ			300倍	種子1kg当 り希釈液20 ml		貯蔵前	1回	種子吹き 付け処理 又は塗沫 処理
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000～ 3000倍		25～ 180ℓ /10a	発生初期～ 収穫10日前 まで		2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	2000倍							
きく	アブラムシ類		100～ 300ℓ /10a	発生初期	6回以内	6回以内			
カーネーション	アブラムシ類 ヨトウムシ類								
しきみ	アブラムシ類								
さかき	アブラムシ類 サカキブチヒメヨコバイ		200～ 700ℓ /10a						

製品写真



最新の登録内容はこちら

